

የዲ.ኬ.ቲ ኢትዮጵያ ምርቶች ማኑዋክ

መጋቢት 2008ዓ.ም.



dkt
ETHIOPIA

የዲ.ኤ.ቲ ኢትዮጵያ ምርቶች ማኑዋል

መጋቢት 2008 ዓ.ም.

ማውጫ

ምዕራፍ 1	5
መግቢያ	
1.1 አጠቃላይ እይታ	
1.2 የማኑዋሉ አስፈላጊነት	
ምዕራፍ 2	7
የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ሴቷ ማህፀን እንዳይገባ የሚያግዱ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ኮንዶሞች	
2.1 የወንድ ላቴክስ ኮንዶም	
2.2 የሴት ኮንዶም	
ምዕራፍ 3.....	16
ማለስለሻ ቅባት	
ስሙዝ ሙቭ	
ምዕራፍ 4	17
በአፍ የሚወሰዱ የእርግዝና መከላከያ አንክብሎች	
4.1 ችይስ	
4.2 ስታይል	
4.3 አይፕላን	
4.4 ፖስትፒል	
4.5 ፋሲል-ዋን	
ምዕራፍ 5	44
በመርፌ መልክ የሚሰጥ የእርግዝና መከላከያ ኮንፌደንስ ዲፖጀስቲን	
ምዕራፍ 6.....	49
በክንድ ቆዳ ስር የሚቀበር የእርግዝና መከላከያ ትረስት ኢምፕላንት II	
ምዕራፍ 7.....	54

በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ

ሎንግአክት

ዩ-ኬር

ምዕራፍ 859

በወሊድ ጊዜ የሚከሰት ከፍተኛ የደም መፍሰስ መከላከያ እና ማከሚያ

ሚሶ-ሬም

ምዕራፍ 962

ደህንነቱ የተጠበቀ የፅንሰ ማቋረጥ

ሀ. በመድኃኑት ፅንሰ መቋረጥ

9.1 ሴፍ-ቲ ኪት

9.2 ማራ-ሴፍ

ለ. በመምጠጫ መሣሪያ ፅንሰ መቋረጥ

9.3 በእጅ ኃይል የሚሰራ መምጠጫ መሣሪያ በመጠቀም ፅንሰ ማቋረጥ(ማኑዋል ቫኪዩም አሲፓይሬሽን)

ምዕራፍ 10.....67

በተቅማጥ በሽታ የሚከሰት የሠውነት ፈሳሽ እጥረት ማከሚያ

ለምለም

ለምለም ፕላስ

ምዕራፍ 11.....70

ንጽህናው የተጠበቀ የማዋለጃ ቁሳቁሶች ጥቅል

እልልታ

እልልታ ፕላስ

ምዕራፍ 1

መግቢያ

ኢትዮጵያ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ካላቸው የአፍሪካ ሀገራት በቀዳሚነት ከሚጠቀሱት ውስጥ ስትሆን በህዝብ ብዛት ከአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። እ.ኤ.አ.በ2015 በተደረገ የህዝብ ትንቢያ መሰረት የህዝብ ብዛቷ ከ96.9 ሚሊዮን በላይ የሚደርስ ሲሆን፤ አመታዊ የህዝብ እድገቷም 2.5% ነው። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በየአመቱ የሀገሪቱ ህዝብ ብዛት በሁለት ሚሊዮን ይጨምራል። ከጠቅላላው የህዝብ ብዛት 23 ሚሊዮኑ በመውለጃ ዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ አጋማሹ ሴቶች ናቸው። እ.ኤ.አ በ2014 በተካሄደ ቁንፅል የስነ ህዝብ እና ጤና ጥናት ውጤት መሠረት በኢትዮጵያ አጠቃላይ የውልደት መጠን (TFR) 4.1 እንደሆነ ታውቋል። በገጠሩ ያለው የውልደት መጠን (4.6) በከተማ ካለው (2.3) አንፃር በጣም የሚበልጥ ሲሆን ይህ ዓይነቱ የመብለጥ ሁኔታ ሁሌም የነበረና ለውጥ ያላሳየ ነው። ሆኖም ግን በሀገር ደረጃ ኢትዮጵያ ባለፉት 20ዓመታት ጊዜ ውስጥ በዓመታዊ የህዝብ ዕድገትም ሆነ በውልደት መጠን መቀነስ አሳይታለች።

1.1 አጠቃላይ እይታ

ባለፉት አስርት አመታት በአለም ዓቀፍ ደረጃ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ቁጥር እያደገ መጥቷል። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ እንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገራት አሁንም ድረስ ከፍተኛ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ፍላጎት ያለባት ሀገር ናት። ምንም እንኳን ይህ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ፍላጎት በበቂ ሁኔታ ያልተመለሰ ቢሆንም፤ በኢትዮጵያ እ.ኤ.አ ከ2000ዓ.ም. ወዲህ በከፍተኛ ደረጃ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ሽፋንን (CPR) በማስፋት በ2000ዓ.ም ከነበረው 8% ሽፋን በ2014ዓ.ም ወደ 34% ማድረስ ተችሏል። ይሁን እንጂ በጊዜ ሂደት ሲታይ የረጅም ጊዜ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ተጠቃሚዎች ቁጥር እንደ አጭር ጊዜ የወሊድ መከላከያ ዘዴ ተጠቃሚዎች እያደገ አይደለም። በአሁኑ ወቅትም በሀገሪቷ በጥቅም ላይ ከሚውሉ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ውስጥ ከፍተኛ ተጠቃሚ ያለውና 76% ድርሻ የሚወስደው በመርፌ መልክ የሚሰጠው የእርግዝና መከላከያ ነው። በተመሳሳይ ባለፉት ዓመታት በወሊድ ጊዜ የሚከሰት የእናቶች ሞት ቅንብ ሲታይም እስከአሁንም ከ100,000 ወላድ እናቶች 353ቱ ለህልልተ ህይወት የሚበቁበት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል።

ኢትዮጵያ በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በሽታ ዙሪያ ከፍተኛ መሻሻል ያሳየች ሲሆን፤ እ.ኤ.አ ከ2001ዓ.ም. ወዲህ አዲስ በሻይረሱ የሚጠቁ ግለሰቦች ቁጥር በ90% አሽቆልቋል። ይህ የአዲስ በሽታው የመጋለጥ ቅንብ መጠንም በአፍሪካ ሀገራት ከተመዘገበው ከፍተኛው ሲሆን በዓለም ደግሞ ሁለተኛው ነው። በአሁኑ ወቅት ከጠቅላላ የሀገሪቷ ህዝብ ቁጥር በመራቢያ ዕድሜ ክልል ከሚገኙት ውስጥ 1.1% የሚሆነው በሻይረሱ

የተጠቃ ሲሆን፤ ይህም በቅነሳ ሊደረስበት ታቅዶ ከነበረው 2.5% የሚሊኒየም ግብ አንፃር በእጅጉ ያነሰ በመሆኑ በከፍተኛ ስኬትነት ተመዘግቧል። ይህም ሆኖ የበሽታው መስፋፋት መጠን በአንዳንድ የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች እና በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ አሁንም ድረስ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል።

በኢትዮጵያ ከአምስት ዓመት በታች ያሉ ህፃናት ሞት ባለፉት ዓመታት ውስጥ ቀንሷል። እ.ኤ.አ ከ2000-2011ዓ.ም ባለው ጊዜ ብቻ በህይወት ከተወለዱ 1,000 ህፃናት ውስጥ 5ኛ ዓመታቸው ላይ ሳይደርሱ ለሞት ይዳረጉ የነበሩ ህፃናት ቁጥር ከ187 ወደ 88 ወርዷል። በተመሳሳይ ወቅት በተቅማጥ በሽታ ተጠቅተው ወደ ጤና ተቋም የተወሰዱ ህፃናት ቁጥር በ2000ዓ.ም. ከነበረው 13% ወደ 32% በ2014ዓ.ም የጨመረ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 26%ቱ በነፍስ አድን ንጥረነገር ውህድ (አ.አር.ኤስ) በመታከም ህይወታቸው ሊታደግ ተችሏል።

ዲ.ኤ.ቲ. ኢትዮጵያ (ዲ.ኤ.ቲ) እ.ኤ.አ ከ1990ዓ.ም ጀምሮ ላለፉት ረጅም ዓመታት በሀገሪቷ ውስጥ ሲሰራ የቆየ መንግስታዊ ያልሆነ እና ትርፋማ ያልሆነ ተቋም ነው። ከሌሎች ትርፋማ ያልሆኑ ተቋማት በተለየ ዲ.ኤ.ቲ. የማህበራዊ ግብይትን በመከተል የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያ (ኮንዶም)፣ የተለያዩ የቤተሰብ ዕቅድ መምሪያ ምርቶችን እና በእናቶችና ህፃናት ጤና ላይ የሚያተኩሩ ምርቶችን ያለትርፍ ለገበያ ያቀርባል። እነዚህን ምርቶች ያለ ማህበራዊ ግብይት ዘዴ በቀር አሁን በሚቀርበው መጠን ብዛትና ዋጋ ለህብረተሰቡ ለማድረስ ፈፅሞ አይቻልም ነበር። ዲ.ኤ.ቲ በሁሉም የሀገሪቷ ክፍሎች የሚሠራ ሲሆን የመንግስት ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዋና ትኩረት ከሆኑት የእናቶችና ህፃናት ጤና እንዲሁም በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዙሪያ ላይ በሰፊው ይሰራል። ዲ.ኤ.ቲ በሀገሪቷ ውስጥ ከሚሰራጩ የቤተሰብ ዕቅድ መምሪያ ምርቶች ውስጥ አንድ ሰነተኛውን ያቀርባል።

1.2 የማንዋሉ አስፈላጊነት

ይህ የዲ.ኤ.ቲ. ኢትዮጵያ ምርቶች ማንዋል የተዘጋጀው ለዲ.ኤ.ቲ የሽያጭ አገልግሎት ሰራተኞች፣ ከዲ.ኤ.ቲ ምርቶች ጋር የቀጥታ ግንኙነት ላላቸው የጤና ባለሙያዎች እና ለሌሎች ደንበኞች ነው። ማንዋሉ ዲ.ኤ.ቲ ኢትዮጵያ የሚያቀርባቸውን የተለያዩ ምርቶች ማብራሪያ ይዟል።

ምዕራፍ 2

የወንዱ የዘር ፍሬ ወደ ሴቷ ማህፀን እንዳይገባ የሚያግዱ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች

የወንዱ የዘር ፍሬ ወደ ማህፀን እንዳይገባ የሚያግዱ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች የምንላቸው ኮንዶም፣ ዲያፍራም፣ የማህፀን በር ቆብ እና የእርግዝና መከላከያ ስፕሪንጅ ናቸው።

ኮንዶሞች

ኮንዶሞች ከስስሩ ላይ የተሰሩ እና የወንዱን ወይም የሴቷን ብልት የሚሸፍኑ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ናቸው። ከእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ውስጥ የአባላዘር በሽታዎችን የሚከላከለው ኮንዶም ብቻ ነው። የአባላዘር በሽታዎች የተለያዩ ዓይነት የመተላለፊያ መንገድ ያላቸው ሲሆኑ፤ በሠውነት ፈሳሽ ወይም በቀጥታ የቆዳ ንክኪ ሊተላለፉ ይችላሉ። ኮንዶም እነዚህን የተለያዩ የአባላዘር በሽታዎች የሚከላከልበት ደረጃ እንደየበሽታው መተላለፊያ መንገድ ይለያያል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ኮንዶም በቀጥታ የቆዳ ንክኪ ከሚተላለፉ የአባላዘር በሽታዎች ይልቅ በሠውነት ፈሳሽ የሚተላለፉ የአባላዘር በሽታዎችን ለመከላከል የበለጠ ውጤታማ ነው። በሠውነት ፈሳሽ የሚተላለፉ የአባላዘር በሽታዎች በባክቴሪያ አማካኝነት የሚከሰቱ እንደ ጨብጥ እና ቂጢኝ ያሉትን እንዲሁም በቫይረስ አማካኝነት የሚተላለፉ እንደ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ያሉትን ያጠቃልላል። ኮንዶም በቀጥታ የቆዳ ንክኪ ሊተላለፉ የሚችሉ የአባላዘር በሽታዎችን መተላለፍ ሊቀንስ የሚችለው በበሽታ የተጠቃው ቆዳ በኮንዶሙ እስከተሸፈነ ድረስ ብቻ ነው።

የተለያዩ ዓይነት ቃና ያላቸው የተለያዩ ኮንዶሞች አሉ። የኮንዶም ልዩ ቃና በራሱ በኮንዶሙ ወይም በያዘው ቅባት ውስጥ ሊኖር ይችላል። አንዳንዴም ቃና እንዲኖራቸው ተደርገው የተሰሩ ኮንዶሞች ከቃናቸው ጋር የሚመሳሰል ቀለም ይኖራቸዋል። ኮንዶሞች በቅርፅ እና ልስላሴም የተለያዩ ዓይነት ተደርገው በመፈብረክ የሴቷን፣ የወንዱን ወይም የሁለቱንም አርካታ በሚጨምር መልኩ ይዘጋጃሉ።

2.1 የወንድ ላቴክስ ኮንዶሞች

ዲኬ.ቲ ኢትዮጵያ የተለያዩ የኮንዶም ዓይነቶችን ለገበያ ያቀርባል

ህይወት ትረስት



ህይወት ትረስት ሚሊታሪ



ሰንሴሽን ራብድ



ሰንሴሽን ኮፊ



ሰንሴሽን ሚንት



ሰንሴሽን ሲናምን
ሰንሴሽን ቤዚክ



ሰንሴሽን ሃኒ



ሰንሴሽን ሒት



ሰንሴሽን ላቭ



ሜምቦርስ ኦንሊ



I. የወንድ ላቴክስ ኮንዶም ምንድን ነው?

የወንድ ላቴክስ ኮንዶም በቆመ የወንድ ብልት ላይ የሚጠለቅ ላቴክስ ከተሰኘ ስስ ላስቲክ የተሰራ ነው። ኮንዶም እርግዝናን መከላከል ብቻ ሳይሆን ከወንድ ወደ ሴት እና ከሴት ወደ ወንድ ሊተላለፉ የሚችሉ የአባላዘር በሽታዎችን ኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ጨምሮ ለመከላከል ይጠቅማል።

II. አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

አስተማማኝነቱ እንደ ተጠቃሚዎቹ አጠቃቀም ይወሰናል። በእያንዳንዱ የግብረሰብ ግንኙነት ወቅት ኮንዶምን በትክክል ካልተጠቀምን እርግዝና የመከሰቱ እና የአባላዘር በሽታዎች የመተላለፍ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። የወንድ ላቴክስ ኮንዶም የመቀደዱ እና እርግዝና የመከሰት ወይም በሽታዎች የመተላለፍ ዕድላቸው በጣም አነስተኛ ነው። ይህም በአብዛኛው ኮንዶሙን በትክክል ባለመጠቀም ስህተት የሚመጣ ነው።

- የትዳር አጋሮቻቸው ወይም የወንድ ጓደኞቻቸው ኮንዶም ከሚጠቀሙ 100 ሴቶች ውስጥ በመጀመሪያው አመት 15 እርግዝናዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይህም ማለት ኮንዶሙ ከ100ዎቹ ሴቶች የ85 ሴቶችን እርግዝና ይከላከላል ማለት ነው።
- የወንድ ላቴክስ ኮንዶምን በዘላቂነት እና ሁሌም በትክክል ከተጠቀምነው ደግሞ 98% ድረስ እርግዝናን ለመከላከል አስተማማኝ ነው።
- ኮንዶምን በእያንዳንዱ የግብረሰብ ግንኙነት ወቅት በትክክል ከተጠቀምነው ከ80% አስከ 95% ድረስ የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ እንዳይተላለፍ ይከላከላል።

III. የጎንዮሽ ችግሮች

የወንድ ላቴክስ ኮንዶም ምንም ዓይነት የጎንዮሽ ችግር አያስከትልም። ሆኖም ግን አንዳንድ አጅግ በጣም ጥቂት የሆኑ ኮንዶሙ ለተሰራበት ላቴክስ የተሰኘ ስለ ላስቲክ አለርጂክ የሆኑ ግለሰቦች ኮንዶም ቢጠቀሙ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሊፈጠር የሚችል የጤና መታወክ ይገጥማል።

IV. የታወቁ ጤና ነክ ጥቅሞች

- እርግዝናን ይከላከላል
- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ የአባላዘር በሽታዎችን ይከላከላል

V. ሊያጋጥሙ የሚችሉ ጤና ነክ ችግሮች

- አጅግ በጣም ጥቂት ግለሰቦች ላይ ከላቴክስ አለርጂ ጋር በተያያዘ የሚከሰት የጤና መታወክ ሊገጥም ይችላል

VI. ስለ የወንድ ላቴክስ ኮንዶም ማወቅ እና መገንዘብ ያለብን ነጥቦች

የወንድ ላቴክስ ኮንዶም፡

- ወንዱን መካን አያደርግም፣ ስንፈተ ወሲብም አያመጣም
- የወንዱን የግብረሰጋ ግንኙነት ፍላጎት አይቀንስም
- በሴቷ ሰውነት ውስጥ ቀርቶ አይጠፋም
- በኮንዶሙ ውስጥ ያለው የወንዱ የዘር ፍሬ ወደ ወንዱ ቢመለስ በወንዱ ላይ ህመም አያስከትልም
- ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ኮንዶምን ደርቦ ማጥለቅ ተጨማሪ የመከላከል ውጤት አይሰጥም። ይልቁንም ኮንዶምን ደርቦ ማጥለቅ በግብረሰጋ ግንኙነት ወቅት በኮንዶሞቹ መካከል በሚፈጠር ፍትጊያ ምክንያት ኮንዶሙ ተንሸራቶ እንዲወልቅ ወይም እንዲቀደድ ሊደርገው ስለሚችል በአንድ ጊዜ ከአንድ ኮንዶም በላይ ማጥለቅ አይመከርም
- ከጋብቻ ውጪ ብቻ ሳይሆን የተጋቡ ባልና ሚስቶችም ኮንዶምን በምርጫቸው መጠቀም ይችላሉ።

VII. የወንድ ላቴክስ ኮንዶምን የምንጠቀመው መቼ ነው?

ተጠቃሚዎች ለመጠቀም በፈለጉ በማንኛውም ጊዜ መጠቀም ይችላሉ።

VIII. ሰንጠረዥ: 2.1 የወንድ ላቴክስ ኮንዶምን እንዴት በትክክል መጠቀም ይቻላል?

የወንድ ኮንዶምን ለመጠቀም መከተል ያለብን መሰረታዊ የሆኑ አምስት ነጥቦች	
መሰረታዊ ነጥቦች	ጠቃሚ ዝርዝር ነጥቦች
<p>1. ለእያንዳንዱ የግብረሰጋ ግንኙነት አዲስ ኮንዶም መጠቀም።</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • ኮንዶሙ የታሸገበትን እሽግ በደንብ ማስተዋል። እሽጉ ከተቀደደ ወይም የብልሽት ምልክት ካለው መጠቀም አይገባም። • የአገልግሎት ጊዜው ያለፈበትን ኮንዶም መጠቀም አያስፈልግም። • የኮንዶሙን እሽግ በጥንቃቄ መክፈት። የእጅ ጥፍር፣ ጥርስ ወይም ሌላ ኮንዶሙን ሊጎዳ የሚችል ስለታማ ነገር መጠቀም አያስፈልግም።
<p>2. ምንም አይነት የአካል ንክኪ ከመፈጠሩ በፊት በቆመው የወንድ ብልት ጫፍ ላይ ኮንዶሙን ማስቀመጥ</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • ለበለጠ ጥንቃቄ የወንዱ ብልት ከማንኛውም የሴቷ አካል ጋር ሳይገናኝ ኮንዶሙን ማጥለቅ።
<p>3. ኮንዶሙን በመተርተር የቆመው የወንድ ብልት ላይ ሙሉ በሙሉ ማጥለቅ</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • ኮንዶሙን ስንተረትር ቀስ ብለን መሆን አለበት። ኮንዶሙን በሀይል ለመተርተር መሞከር ኮንዶሙ በግብረሰጋ ግንኙነት ወቅት እንዲቀደድ ሊያደርግ ይችላል። • ኮንዶሙ በቀላሉ አልተረተር ካለ ኮንዶሙ በተሳሳተ አቅጣጫ ወደኋላ ታጥፎ ወይም ከጥቅም ውጭ ሆኖ ወይም በጣም አርጅቶ ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ኮንዶሙን በመጣል አዲስ ኮንዶም መጠቀም ያስፈልጋል። ኮንዶሙ ወደኋላ ታጥፎ ቢሆንና ሌላ ተጨማሪ ኮንዶም ባይኖረን አቅጣጫውን በማዞርና የታጠፈውን በመዘርጋት በቆመው የወንድ ብልት ላይ በማጥለቅ መጠቀም ይቻላል።

<p>4. የወንድ የዘር ፍሬ ከፈሰሰ በኋላ በምስሉ ላይ እንደሚታየው የኮንዶሙን ክፍት ጫፍ ቀለበት በመያዝ የወንድ ብልት እንደቆመ ከሴቷ ብልት ውስጥ ማውጣት።</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • የወንድን ብልት ከሴቷ ብልት ውስጥ ማውጣት። • የወንድ የዘር ፍሬ እንዳይፈስ በጥንቃቄ ኮንዶሙን ማውለቅ። • በድጋሚ የግብረሰጋ ግንኙነት ማድረግ ካስፈለገ ወይም ከአንድ አይነት የግብረሰጋ ግንኙነት ወደ ሌላ አይነት መቀየር ሲያስፈልግ አዲስ ኮንዶም መጠቀም ያስፈልጋል።
<p>5. የተጠቀምንበትን ኮንዶም በጥንቃቄ ማስወገድ</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • ኮንዶሙን ታሽጎበት በነበረው ማሽኒያ መጠቅለል እና በቆሻሻ መጣያ ውስጥ ወይም የመሬት መቀመጫ መፀዳጃ ቤት ውስጥ መጣል ያስፈልጋል። በውሃ በሚሰራ መፀዳጃ ቤት መቀመጫ ውስጥ ኮንዶሙን መጣል ትቦውን በመድፈን ችግር ስለሚፈጥር እነዚህ አይነት መፀዳጃዎች ውስጥ ኮንዶሙን መጣል አያስፈልግም።

የወንድ ላቴክስ ኮንዶም ተጠቃሚዎች ማድረግ የሌባቸው ነገሮች

የኮንዶሙን የመቀደድ ዕድል የሚጨምሩ እና መወገድ ያለባቸው አንዳንድ ተግባራት፡-

- ኮንዶሙን በመጀመሪያ ተርትር በወንድ ብልት ላይ ለማጥለቅ መሞከር አያስፈልግም። ይልቁንም ኮንዶሙ ሳይተረተር በቆመ የወንድ ብልት ጫፍ ላይ በማስቀመጥ በብልቱ ላይ እንዳለ መተርተር
- ዘይትነት ያላቸው ማለስለሻ ቅባቶችን መጠቀም አያስፈልግም። ምክንያቱም በኮንዶሙ ውስጥ የሚገኘውን ላቴክስ ከጥቅም ውጭ ስለሚያደርገው ነው። ተጨማሪ ማለስለሻ ካስፈለገ ዘይትነት የሌላቸውን ማለስለሻ ቅባቶች መጠቀም ይቻላል።
- የኮንዶሙ ቀለም ከተቀየረ የብልሽት ምልክት ስለሆነ መጠቀም አያስፈልግም።
- ኮንዶሙ የደረቀ ወይም በጣም የተጣበቀ ከሆነ የብልሽት ምልክት ስለሆነ መጠቀም አያስፈልግም።
- አንዴ የተጠቀምነውን ኮንዶም መልሶ መጠቀም አያስፈልግም።

በተጨማሪም በተለያዩ የግብረሰጋ ግንኙነቶች ወቅት ከአንዱ አይነት የግብረሰጋ ግንኙነት ወደ ሌላው አይነት መቀየር ቢፈለግ ለምሳሌ፡- የግብረሰጋ ግንኙነት ከፈንጢጣ ወደ ሴቷ ብልት ሲቀየር አንድ ኮንዶም መጠቀም አያስፈልግም። ምክንያቱም በሽታ ሊያመጡ የሚችሉ ባክቴሪያዎችን ከፈንጢጣ ወደ ብልት ሊያስተላልፍ ስለሚችል ኮንዶሙ መቀየር አለበት።

2.2 የሴት ኮንዶም

I. የሴት ኮንዶም ምንድን ነው?

ሴቶች በግብረሰጋ ግንኙነት ጊዜ በብልታቸው ውስጥ በማጥለቅ የሚጠቀሙበት የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ነው። የተሰራውም በጣም ስለ ከሆነ ቅባት ያለው ፕላስቲክ ሲሆን በሁለቱም ጫፍ ቀለበቶች አሉት።



ምስል 2.1 የሴት ኮንዶም

II. እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

አስተማማኝነቱ እንደ ተጠቃሚዎቹ አጠቃቀም ሁኔታ ይወሰናል። በእያንዳንዱ የግብረሰጋ ግንኙነት ወቅት ሴቷ ኮንዶሙን በትክክል ካልተጠቀመች እርግዝና የመከሰቱ እና የአባላዘር በሽታዎች የመተላለፍ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። የሴት ኮንዶም የመቀደዱ እና እርግዝና የመከሰት ወይም በሽታዎች የመተላለፍ ዕድላቸው በጣም አነስተኛ ነው።

- ከ100 የሴት ኮንዶም ከሚጠቀሙ ሴቶች ውስጥ በመጀመሪያው አመት 21 እርግዝናዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይህም ማለት ኮንዶሙ ከ100ዎቹ ሴቶች የ79 ሴቶችን እርግዝና ይከላከላል ማለት ነው።
- የሴት ኮንዶምን በእያንዳንዱ የግብረሰጋ ግንኙነት ወቅት በትክክል ከሚጠቀሙ 100 ሴቶች ውስጥ ደግሞ በመጀመሪያው አመት ውስጥ 5 እርግዝናዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ።

III. የጎንዮሽ ችግሮች

የሴት ኮንዶም ምንም ዓይነት የጎንዮሽ ችግር አያስከትልም።

IV. የታወቁ ጤና ነክ ጥቅሞች

- እርግዝናን ይከላከላል።
- ከኤች.አይ.ቪ/ኤድስ እና ሌሎች የአባላዘር በሽታዎች ይከላከላል።

V. ሊያጋጥሙ የሚችሉ ጤና ነክ ችግሮች

የሴት ኮንዶም ከመጠቀም ጋር በተያያዘ የሚከሰት ምንም ዓይነት የጤና መታወክ የለም።

VI. ስለሴት ኮንዶም ማወቅ እና መገንዘብ የሚገባን

የሴት ኮንዶም:

- በሴቷ አካል ውስጥ ቀርቶ አይጠፋም
- ለመጠቀም አስቸጋሪ አይደለም። ነገር ግን ትክክለኛውን አጠቃቀም መማር ያስፈልጋል።
- ከጋብቻ ውጪ ብቻ ሳይሆን የተጋቡ ባልና ሚስቶችም በምርጫቸው መጠቀም ይችላሉ።
- ሴቶች ኮንዶም መጠቀም ሲፈልጉ በራሳቸው መጠቀም መጀመር ይችላሉ።
- በግብረሰጋ ግንኙነት ወቅት ከወንድ ላቴክስ ኮንዶም ጋር ሲነፃፀር የተሻለ ተፈጥሮአዊ ልስላሴ እና እርጥበት አለው።
- ከወንድ ላቴክስ ኮንዶም ጋር ሲነፃፀር እርግዝናን እና የአባላዘር በሽታዎችን የመከላከል አስተማማኝነቱ በመጠኑ ይቀንሳል።
- ለአንዳንድ ሴቶች የውጪኛው ቀለበት በግብረሰጋ ግንኙነት ወቅት ተጨማሪ መነቃቃትን ይፈጥራል።


VII. መጠቀም የሚቻለው መቼ ነው?

ተጠቃሚዎ መጠቀም በፈለጉትበት በማንኛውም ሰዓት መጠቀም ትችላላች።

VIII. ሰንጠረዥ: 2.2 የሴት ኮንዶምን እንዴት በትክክል መጠቀም ይቻላል?

የሴት ኮንዶምን ለመጠቀም መከተል ያለብን መሰረታዊ የሆኑ አምስት ነጥቦች	
መሰረታዊ ነጥቦች	ጠቃሚ ዝርዝር ነጥቦች
1. ለእያንዳንዱ የግብረ ሰጋ ግንኙነት አዲስ ኮንዶም መጠቀም።	<ul style="list-style-type: none"> • ኮንዶሙ የታሸገበትን እሽግ በደንብ ማስተዋል። እሽጉ ከተቀደደ ወይም የብልሽት ምልክት ካለው መጠቀም አይገባም። • የአገልግሎት ጊዜው ያለፈበትን ኮንዶም መጠቀም አያስፈልግም። • የኮንዶሙን እሽግ በጥንቃቄ መክፈት። የእጅ ጥፍር፣ ጥርስ ወይም ሌላ ኮንዶሙን ሊጎዳ የሚችል ስለታማ ነገር መጠቀም አያስፈልግም።

2. ምንም ዓይነት የአካል ንክኪ ከመፈጠሩ በፊት ኮንዶሙን በሴቷ ብልት ውስጥ ማስገባት።



- የግብረ ስጋ ግንኙነት ከመደረጉ እስከ 8 ሰዓታት በፊት ጀምሮ ኮንዶሙን በሴቷ ብልት ውስጥ ማስገባት ይቻላል።
- አዲስ ተጠቃሚ ሴት የሚቀጥለውን የግብረ ስጋ ግንኙነት ከማድረግ በፊት ኮንዶሙን ማስገባት እና ማስዎጣት እንድትለማመድ ይመከራል። የሴት ኮንዶምን በትክክል መጠቀም ቀላል የሚሆነው በመለማመድ ነው።
- ለበለጠ ጥንቃቄ የወንዱ ብልት ከሴቷ ብልት ጋር ንክኪ ከመፍጠሩ በፊት ኮንዶሙን ማስገባት ያስፈልጋል።
- ኮንዶሙን ለማስገባት የሚያመች አቀማመጥ መምረጥ፣ መንቋጠጥ፣ አንድ እግርን ማንሳት፣ መቀመጥ ወይም በጀርባ መተኛት። ሴቷ የተለያዩ የአቀማመጥ አይነቶችን በመሞከር የትኛው ለእርሷ ኮንዶሙን ለማስገባት እንደሚቀላት እንድትመርጥ ይመከራል።
- በኮንዶሙ ውስጥ ያለውን ቅባት በአኩል ለማዳረስ የኮንዶሙን ጎኖች ማስተሻሻት።
- በተዘጋው ጫፍ በኩል ያለውን ቀለበት ጨመቅ አድርጎ በመያዝ ኮንዶሙ እረዘም እና ጠብብ እንዲል ማድረግ፤
- በሌላኛው እጅ የሴቷን ብልት የውጫኛውን ከንፈር መለያየት እና የሴቷ ብልት ቀዳዳ የሚገኝበትን ቦታ ማግኘት።
- የውስጠኛውን ማለትም በተዘጋው ጫፍ በኩል ያለውን ቀለበት ወደ ሴቷ ብልት ውስጥ መሄድ የሚችልበት ርቀት ድርስ ቀስ ብለን መግፋት። በኮንዶሙ ውስጥ የእጅ ጣትን በማስገባት ኮንዶሙ ቦታውን እስኪይዝ ድረስ ወደውስጥ መግፋት።
- ከ2 እስከ 3ሳ.ሜ የሚሆነው የኮንዶሙ ክፍል እና የኮንዶሙ የውጫኛው ቀለበት ከሴቷ ብልት ውጭ እንዲቀር ማድረግ።

3. የወንዱ ብልት ኮንዶሙ ውስጥ መግባቱን እና ኮንዶሙ ውስጥ መቆየቱን ማረጋገጥ

- ወንዱ ወይም ሴቷ የወንዱን ብልት ወደ ኮንዶሙ ውስጥ እንዲገባ በጥንቃቄ መምራት አለባቸው። የወንዱ ብልት በሴቷ ብልት እና በኮንዶሙ መካከል መሆን የለበትም። የወንዱ ብልት ከኮንዶሙ ውጭ ከሆነ ብልቱን ማውጣት እና እንደገና መሞከር ያስፈልጋል።
- በአጋጣሚ ኮንዶሙ ከሴቷ ብልት ውስጥ ቢወጣ ወይም በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት ወደውጪ መቅረት የነበረበት የኮንዶሙ ክፍል ሙሉ-በሙሉ ወደ ውስጥ ቢገፋ ኮንዶሙን እንደገና ወደነበረበት መመለስ ያስፈልጋል።



4. ወንዱ ብልቱን ከሴቷ ብልት ውስጥ ካወጣ በኋላ የወንዱ የዘር ፍሬ እንዳይፈስ በጥንቃቄ የኮንዶምን ውጪኛውን ቀለበት ጠምዝዞ በመዝጋት ቀስ ብሎ ኮንዶምን ጎትቶ ማውጣት



- የሴት ኮንዶምን ከግብረሰጋ ግንኙነት በኋላ ወዲያውኑ ማውጣት እና ማስወገድ ላያስፈልግ ይችላል።
- የወንዱ የዘር ፍሬ እንዳይፈስ ለማድረግ ሴቷ ኮንዶምን ተነስታ ከመቆሚያ በፊት ማውጣት አለባት።
- ጥንዶቹ የግብረሰጋ ግንኙነት በድጋሚ ለማድረግ ከፈለጉ አዲስ ኮንዶም መጠቀም አለባቸው። የሴት ኮንዶምን በድጋሚ መጠቀም አያስፈልግም።

5. የተጠቀምንበትን ኮንዶም በጥንቃቄ ማስወገድ



- ኮንዶምን ታሸጎበት በነበረው ማሸጊያ መጠቅለል እና በቆሻሻ መጣያ ውስጥ ወይም የመሬት መቀመጫ መፀዳኛ ቤት ውስጥ መጣል ያስፈልጋል። በውሃ በሚሰራ መፀዳኛ ቤት መቀመጫ ውስጥ ኮንዶምን መጣል ትብውን በመድፈን ችግር ስለሚፈጥር እነዚህ አይነት መፀዳኞች ውስጥ ኮንዶምን መጣል አያስፈልግም።

ምዕራፍ 3

ማለስለሻ ቅባት

ስሙዝ ሙብ

1. ስሙዝ ሙብ ምንድን ነው?

ስሙዝ ሙብ ለስላሳ፣ ዘይትነት የሌለው፣ የማያጣብቅ፣ ሽታ እና ቀለም አልባ ዝልግልግ ማለስለሻ ቅባት ነው። እያንዳንዱ ስሙዝ ሙብ በውስጡ 5 ሚሊ ሊትር ማለስለሻ ቅባት ይዟል።



ምስል 3.1 ስሙዝ ሙብ ማለስለሻ ቅባት

ስሙዝ ሙብ፡

- በግብረሰጋ ግንኙነት ወቅት ተጨማሪ ማለስለሻ ቅባት ለሚያስፈልጋቸው ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፤
- ከላቴክስ ኮንዶምች ጋር መጠቀም የሚቻል ሲሆን፤ የግብረሰጋ ግንኙነት በሚደረግበት ወቅት ሊፈጠር የሚችልን ድርቀት በማስወግድ የወንድ ላቴክስ ኮንዶምን ከመቀደድ ይታደጋል፤
- ለግብረሰጋ ግንኙነት ዝግጁ በሆነ የወንድ ብልት ወይም በሴት የመራቢያ አካላት ወይም በኮንዶም የላይኛው ክፍል ላይ ያለስጋት ሊደረግ ይችላል፤
- ዘይትነት የሌለው ቅባት ስለሆነ በቀላሉ በመታጠብ ይጸዳል፤
- ምንም ዓይነት የጎንዮሽ ጉዳት ወይም በጤና ላይ ሊያስከትለው የሚችል ችግር የለም።

ምዕራፍ 4

በአፍ የሚወሰዱ የእርግዝና መከላከያ እንክብሎች

የእርግዝና መከላከያ እንክብሎች ብዙ ጊዜ የወሊድ መከላከያ ወይም ፕሊስብ በመባል የሚታወቁ ሲሆን፤ በውስጣቸው ጥምር ፕሮጀስቲቭ እና ኤስትሮጂን የተባሉ አካላዊ ቅመሞች (ሆርሞኖች) ወይም ነጠላ ፕሮጀስቲቭ የተባለ አካላዊ ቅመም (ሆርሞን) ብቻ ይይዛሉ።

ዲ.ኬ.ቲ ኢትዮጵያ የተለያዩ የእርግዝና መከላከያ እንክብሎችን ያቀርባል። እነዚህም ፦

- ችይስ እና ስታይል ፦ ባለጥምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ እንክብሎች
- አይፕላን ፦ ባለነጠላ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ እንክብል
- ፖስትፒል እና ፋሲል-ዋን፦ ባለነጠላ አካላዊ ቅመም የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ እንክብሎች

4.1 ችይስ

I. ችይስ ምንድን ነው?

ችይስ በአፍ የሚወሰድ ባለጥምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ እንክብል ሲሆን፤ የተሰራውም በተፈጥሮ በሴቶች አካል ውስጥ የሚመረቱትን ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስቲቭን አካላዊ ቅመሞች (ሆርሞኖች) ከሚመሳሰሉ በጣም ዝቅተኛ መጠን ካላቸው ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስቲቭን የተባሉ በሳይንሳዊ መንገድ የተፈበረኩ ንጥረ ነገሮች ነው።

በችይስ እሽግ ውስጥ የሚገኙት ከአካላዊ ቅመም ጋር ተመሳሳይነት ካላቸው ንጥረ ነገሮች የተፈበረኩ የእርግዝና መከላከያ እንክብሎች ሁሉም ባለአኩል መጠን የኤስትሮጅን እና ፕሮጀስቲቭን ይዘት አሏቸው። እያንዳንዱ የችይስ እሽግ ባለ 28 ፍሬ ሲሆን፤ ይዘታቸው ሌቮኖርጀስትሪል 0.15 ሚ.ግ + ኢትናይልአስትራዲዮል 0.03 ሚ.ግ የሆነ 21 ነጭ የእርግዝና መከላከያ እንክብሎች እና ይዘታቸው ፊሪስ ፋሚልት 75 ሚ.ግ የሆነ 7 ቡኒ የአይረን እንክብሎችን ይይዛል።



ምሳሌ: 4.1 ችይስ በአፍ የሚወሰድ የእርግዝና መከላከያ እንክብል

II. እርግዝናን የሚከላከለው እንዴት ነው?

- የሴቷ እንቁላል ከእንቁልጢ ተኮርታ (በስላ) እንዳትወጣ በማድረግ (ውጻትን በመከላከል)፤
- የማህፀን በር ፈሳሽን በማወፈር የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ማህፀን እንዳያልፍ በማገድ፤
- የማህፀን ግድግዳን በማሳሳት ከወንድ የዘር ፍሬ ጋር የተዋህደች እንቁላል በማህፀን ግድግዳ ላይ ብታርፍ እንኳን ለፅንሱ ቀጣይ እድገት እንዳይመች በማድረግ እርግዝና እንዳይፈጠር ይከላከላል።

III. እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

አስተማማኝነቱ እንደ ተጠቃሚዎቹ የአጠቃቀም ሁኔታ ይወሰናል። ሴቷ የቾይስ እንክብል የያዘውን አዲስ እሽግ ሶስት ቀናት እና ከዚያ በላይ ዘግይታ ከጀመረች ወይም የእንክብል እሽጉን በምትጀምርበት ወይም በምትጨርስበት ቀናት አካባቢ ለሶስት ቀናት እና ከዚያም በላይ የእርግዝና መከላከያ እንክብሉን ሳትወስድ ከቀረች እርግዝና የመከሰት እድሉ ከፍተኛ ነው።

በአብዛኛው ቾይስን ከሚጠቀሙ 100 ሴቶች በ8ቱ ላይ በመጀመሪያው ዓመት እርግዝና ሊከሰት ይችላል። ይህም ማለት ቾይስን ከሚጠቀሙ 100 ሴቶች ውስጥ 92 ለእርግዝና አይጋለጡም።

የቾይስ እንክብል በትክክል ከተወሰደ እና አወሳሰዱ ላይ ችግር ከሌለ ደግሞ እንክብሉን ከሚጠቀሙ 1000 ሴቶች ውስጥ በመጀመሪያው ዓመት ውስጥ እርግዝና ሊከሰት የሚችለው በ 3ቱ ሴቶች ላይ ብቻ ነው።

የቾይስ እንክብል ስትጠቀም የነበረች ሴት እንክብሉን መውሰዷን በመተው ለማርገዝ ብትፈልግ ወዲያውኑ ማርገዝ ትችላለች።

ቾይስ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ ከማንኛውም ተላላፊ የአባላዘር በሽታዎች አይከላከልም።

IV. የጎንዮሽ ችግሮች

- በወር አበባ ላይ የሚከሰቱ ለውጦች
 - ለምሳሌ፡- የወር አበባ መጠን መቀነስ፣ ወር አበባ የሚፈሰባቸው ቀናት ማነስ
 - የወር አበባ መዛባት
 - በወር ውስጥ በማንኛውም ቀን የሚከሰት የደም መፍሰስ
 - የወር አበባ መቅረት
- መጠነኛ የራስ ምታት
- ድብርት
- ማቅለሽለሽ (በአብዛኛው ከ2-3 ወራት ጊዜ ውስጥ ይህ ስሜት ይጠፋል)

- የጡት መደደር
- መጠነኛ የክብደት መጨመር ወይም መቀነስ
- የስሜት መለዋወጥ
- ብጉር (ሊባባስ ወይም ሊቀንስ የሚችል ሲሆን በአብዛኛው ግን ይቀንሳል)

V. ጃይስ የሚያስገኛቸው ጤና ነክ ጥቅሞች

ጃይስ እርግዝናን ከመከላከል በተጨማሪ የሚከተሉትን የጤና ችግሮች ለመከላከል ይረዳል፡-

የማህፀን ግድግዳ ካንሰር

የእንቁልጢ ካንሰር

የማህፀን ቁስለት

ከወር አበባ መዛባት እና መብዛት ጋር የተያያዙ የደም ማነስ ችግሮችን

የሚከተሉትን ደግሞ ይቀንሳል፡-

በወር አበባ ጊዜ የሚከሰተውን የሆድ ቁርጠት

በውጻት ጊዜ የሚፈጠር የህመም ስሜት

በሰውነት ወይም በፊት ላይ የጸጉር መብዛትን እና ብጉር

አንዳንድ ሴቶች ለምን ጃይስን ይመርጣሉ?

እንክብሉ በሴቷ ቁጥጥር ስር ያለ መሆኑ

ያለ ጤና ባለሙያ እርዳታ በማንኛውም ሰዓት ማቋረጥ መቻሉ

በግብረ ስጋ ግንኙነት መሐል አለማስተጓጎሉ

VI. ጃይስ ሊያስከትላቸው የሚችሉ የጤና ችግሮች

የመከሰት እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም

በእግር የደም ስሮች እና በሳንባ ውስጥ የደም መርጋት

የመከሰት እድላቸው እጅግ በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም

በጭንቅላት ውስጥ የሚከሰት የደም መፍሰስ እና

ድንገተኛ የልብ ህመም

VII.. ስለ ችግር ማወቅ እና መገንዘብ ያለብን

ችግር:

ምንም እንኳን ችግር በየቀኑ የሚወሰድ እንክብል ቢሆንም በሴቷ ሰውነት ውስጥ የሚኖረው የሆርሞኑ መጠን እየጨመረ ስለማይሄድ ሴቷ ችግሩን ማቋረጥ የለባትም።

ሴቷ በዚያ ቀን የግብረ ስጋ ግንኙነት ብታደርግም ባታደርግም እንክብሉን በየቀኑ መውሰድ አለባት።

ችግር:

ሴቶች መካን እንዲሆኑ አያደርግም

ሴቶች አካል ጎደሎ ወይም መንታ ልጅ እንዲወልዱ አያደርግም

በሴቶች የግብረ ስጋ ግንኙነት ፍላጎት ላይ ምንም ዓይነት ለውጥ አያስከትልም

በየቀኑ ስለሚሟሟ በጨጓራ ወይም በሰውነት ውስጥ አይከማችም

ነፍስ ጡር ሴት ማርዝን ሳታውቅ ብትወስደው በእርግዝና ላይ ምንም ዓይነት ችግር አያስከትልም

VIII. ችግሩን መጠቀም የሚችሉት የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

ችግር በአጠቃላይ ለሁሉም ሴቶች ተስማሚ እና ምቹ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ነው። ችግሩን መጠቀም የሚችሉ ሴቶች፡-

- ልጅ ያላቸው ወይም የሌላቸው
- ያገቡ ወይም ያላገቡ
- አፍላ ወጣቶች እና ከ 40 ዓመት በላይ የሆናቸው ሴቶችን ጨምሮ በማንኛውም የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶች
- ፅንሰ ያቋረጠች ወይም ያስወረዳት ሴት
- የደም ማነስ ያለባቸው ወይም በፊት የነበረባቸው ሴቶች
- የፀረ ኤች.አይ.ቪ መድሀኒት ቢወስዱም ባይወስዱም ኤች.አይ.ቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሴቶች ችግሩን በአስተማማኝነት መጠቀም ይችላሉ።

ሴቶች ችግሩን :

ምንም የማህፀን በር እና የማህፀን አካባቢ ምርመራ እንዲሁም

ምንም ዓይነት የላቦራቶሪ ምርመራ ሳያደርጉ ለእርግዝና መከላከያነት መጠቀም መጀመር ይችላሉ።

ቾይስ የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ ላለባቸው ሴቶች

ኤች.አይ.ቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለ ወይም የፀረ ኤች.አይ.ቪ መድሀኒት ህክምና የሚወስዱ ሴቶች ቾይስን መጠቀም ይችላሉ።

እነዚህን ሴቶች ከቾይስ ጋር በጥምረት ኮንዶም እንዲጠቀሙ ማበረታታት ያስፈልጋል። ኮንዶም በትክክል እና በዘላቂነት ከተጠቀምነው የአባላዘር በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳል። ኮንዶም የፀረ ኤች.አይ.ቪ መድሀኒት ህክምና ለሚወስዱ ሴቶች እንደ ተጨማሪ የእርግዝና መከላከያም ያገለግላል። የፀረ ኤች.አይ.ቪ መድሀኒቶች የቾይስን የእርግዝና መከላከል አስተማማኝነት መቀነስ አለመቀነሳቸው በጥናት አልተረጋገጠም።

IX. ቾይስን መጠቀም የማይችሉት የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

- ያረዘዘች ወይም እንዳረዘዘች የምትጠረጠር ሴት
- ባለፈው 3 ወራት ጊዜ ውስጥ የወለደች እናት
- ከወለደች 6 ወራት ወይም ከዚያ በታች የሆናት የምታጠባ እናት
- በሳንባ ውስጥ የደም መርጋት ካለ ወይም ከነበረ
- ከዚህ በፊት በጭንቅላት እና የደም ስሮች ላይ የደረሰ አደጋ ከነበረ
- የልብ እና የልብ ሷንጫ ህመም ካለ ወይም ከነበረ
- ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ያለባቸው ሴቶች
- ከደም ዑደት ጋር የተቆራኘ የሰኳር በሽታ ካለ
- ከነርቭ ጋር የተያያዘ የራስ ምታት ካለ
- ከፍተኛ የቀዶ ጥገና ያደረገች ሴት
- የጡት ካንሰር ካለ
- የጉበት ካንሰር ካለ
- የጉበት ህመም ችግር ካለ
- በቀን ከ15 ሲጋራዎች በላይ የሚያጨሱ እና ዕድሜያቸው ከ35 ዓመት በላይ የሆነ ሴቶች እና
- እንክብሉ የተሰራበት ንጥረነገሮች እንደማይሰማማት የተረጋገጠ ሴት

X. የቾይስ እርግዝና መከላከያ እንክብል የአወሳሰድ መመሪያ

<p>የመጀመሪያው እንክብል አወሳሰድ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ በእያንዳንዱ የቾይስ ካርቶን አሽግ ውስጥ ሶስት ባለ28 እንክብል እሾጎች የሚገኙ ሲሆን፤ እነዚህ እሾጎች አንዱ ለአንድ የወር አበባ ዑደት የሚያገለግል የሶስት ተከታታይ ወራት የእርግዝና መከላከያ እንክብሎችን ይዟል። ➤ ቾይስ የእርግዝና መከላከያ እንክብልን መጠቀም ለመጀመር ሁለት አማራጮች አሉ፡- <ul style="list-style-type: none"> ሀ. የሚቀጥለው የወር አበባ እስኪመጣ በመጠበቅ የመጀመሪያውን እንክብል በመጀመሪያው የወር አበባ ቀን መውሰድ።። ቀጣዮቹን እንክብሎች በመመሪያው መሠረት በቀን አንድ ፍሬ መውሰድ መቀጠል።። ለ. የመጀመሪያውን እንክብል በማንኛውም ቀን መውሰድ በመጀመር ቀጣዮቹን እንክብሎች በመመሪያው መሠረት በቀን አንድ ፍሬ መውሰድ መቀጠል።። ሆኖም ግን ይኸኛው አማራጭ ከተወሰደ እንክብሉ ከተጀመረበት ቀን አንስቶ ለመጀመሪያዎቹ 7 ተከታታይ ቀናት መጠበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን በተጨማሪነት መጠቀም ያስፈልጋል።። ➤ የመጀመሪያውን እንክብል ለመውሰድ እንክብሎቹን ከያዘው ከአንዱ አሽግ ውስጥ ከእሾጉ በስተጀርባ በግራ እጅ በኩል ከላይ ጫፍ የሚገኘውን የመጀመሪያውን እንክብል መዋጥ፤ ➤ ከዚያም የቀሩትን እንክብሎች ለመውሰድ በእሾጉ ላይ ያሉትን አቅጣጫ ጠቋሚ ቀስቶች መከተል።።
<p>ሰለ እንክብል አወሳሰዱ አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ እንክብል የያዘው አሽግ ባዶ እስኪሆን ድረስ በየቀኑ አንድ እንክብል በተመሳሳይ ሰዓት መዋጥ።። ➤ በተቻለ መጠን እያንዳንዱን እንክብል በተመሳሳይ ጊዜ መውሰድ ተጠቃሚዎች እንክብሎችን ለመዋጥ እንዳይረሱ ያግዛቸዋል።። እንዲሁም የተወሰኑ የጎንዩሽ ችግሮችን ይቀንሳል።።
<p>አንዱ እንክብሎቹን የያዘ አሽግ ሲጨረስ የሚቀጥለው አሽግ እንዴት እንደሚጀመር</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ሴቷ አንዱን እንክብል የያዘ አሽግ እንደጨረሰች በሚቀጥለው ቀን ከሚቀጥለው አሽግ የመጀመሪያዋን እንክብል መውሰድ አለባት።። የሚቀጥላውን አሽግ ዘግይቶ መጀመር እርግዝና ሊያስከትል ይችላል።።

<p>እንክብሉን ቢታዘዘው መሠረት በወቅቱ አለመውሰድ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ እንክብሉ በየዕለቱ በተመሳሳይ ሰዓት አንድ ፍሬ ሳይወሰድ ከቀረ እርግዝናን የመከላከል ኃይሉ ይቀንሳል። ➤ ሴቷ እንክብሉን የመውሰጃ ሰዓቷ ካለፈ በኋላ ብታስታውስ ወዲያውኑ የዘነጋችውን እንክብል መውሰድ ይኖርባታል። ➤ ሴቷ በዕለቱ መውሰድ የሚገባትን እንክብል አለመውሰዷን በነጋታው ብታስታውስ ሁኔታውን ባስታወሰችበት ቀን የሁለቱን ቀናት ሁለት እንክብሎች አንድ ላይ መውሰድ ይኖርባታል። ➤ ሴቷ በወር ውስጥ ሶስቱ እና ከዚያ በላይ እንክብሉን ሳትወስድ ከቀረች ወይም እንክብሉን የያዘውን እሽግ ሶስት ቀንና ከዚያ በላይ ዘግይታ ከጀመረች እርግዝና የመከሰት ዕድሉ ከፍተኛ ስለሚሆን መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን በተጨማሪነት መጠቀም ያስፈልጋታል። ➤ ሴቷ በወር አበባ ዑደቷ ሶስተኛ ሳምንት ላይ ሶስት ወይም ከዚያ በላይ እንክብሎችን ሳትወስድ ከቀረች በእሽጉ ውስጥ የሚገኘውን ቡኒ የአይረን እንክብል መውሰድ ትታ በቀጥታ ከሚቀጥለው እሽግ ላይ ነጩን የጥምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ እንክብል መውሰድ ይኖርባታል። ➤ ሴቷ የእርግዝና መከላከያ እንክብሉን በወሰደች በ2 ሰዓታት ውስጥ ካስመለሳት በተቻለ ፍጥነት የእርግዝና መከላከያ እንክብሎቹን ከያዘው እሽግ ውስጥ ሌላ እንክብል መውሰድና ቀሪውን እንደበፊቱ በቀጣይነት መውሰድ ይኖርባታል።
<p>መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ስለመጠቀም</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ሴቷ ዘንግታ ወይም በሌላ ምክንያት እንክብሉን ሳትወስድ ብትቀር ሌላ መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ በተጨማሪነት መጠቀም ያስፈልጋታል። ➤ መጠባበቂያ የእርግዝና ዘዴዎች የምንላቸው ከሩካቤ መታቀብ፣ የወንድ ወይም የሴት ኮንዶም መጠቀም፣ ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያዎችን መጠቀም፣ የወንዱን ዘር ፍሬ የሚገድሉ ቅባቶች መጠቀም እና የወንዱን የዘር ፍሬ ወደ ውጭ የማፍሰስ ዘዴ ናቸው። የወንዱን ዘር ፍሬ የሚገድሉ ቅባቶች እና የወንዱን የዘር ፍሬ ወደ ውጭ ማፍሰስ ዝቅተኛ የእርግዝና መከላከል ውጤት ሲኖራቸው፣ ኮንዶም መጠቀም እና ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያዎችን መጠቀም ደግሞ የተሻለ አስተማማኝ የእርግዝና መከላከል ብቃት አላቸው።

4.2 ስታይል

ስታይል ምንድን ነው?

ስታይል በአፍ የሚወሰድ ባለጥምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ እንክብል ሲሆን፤ የተሰራውም በተፈጥሮ በሴቶች አካል ውስጥ የሚመረቱትን ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስቲን አካላዊ ቅሞች (ሆርሞኖች) ከሚመሰሰሉ በጣም ዝቅተኛ መጠን ካላቸው ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስቲን የተባሉ በሳይንሳዊ መንገድ የተፈበረኩ ንጥረ ነገሮች ነው።

በስታይል እሽግ ውስጥ የሚገኙት ከአካላዊ ቅመም ጋር ተመሳሳይነት ካላቸው ንጥረ ነገሮች የተፈበረኩ የእርግዝና መከላከያ እንክብሎች የተለያዩ መጠን የኤስትሮጅን እና ፕሮጀስቲን ይዘት አሏቸው። እያንዳንዱ የስታይል እሽግ ባለ 21 ፍሬ ሲሆን፤ ይዘታቸው ሌቮኖርጀስትሪል 0.05 ሚ.ግ + ኢትናይልእስትራዲዮል 0.03 ሚ.ግ የሆነ 6ፍሬ ቡኒ ፣ ይዘታቸው ሌቮኖርጀስትሪል 0.075 ሚ.ግ + ኢትናይልእስትራዲዮል 0.04 ሚ.ግ የሆነ 5ፍሬ ነጭ እና ይዘታቸው ሌቮኖርጀስትሪል 0.125 ሚ.ግ + ኢትናይልእስትራዲዮል 0.03 ሚ.ግ የሆነ 10ፍሬ ቢጫ የእርግዝና መከላከያ እንክብሎችን ይይዛል።

ስታይል እርግዝናን ለመከላከል እና የወር አበባ ጊዜውን ጠብቆ እንዲመጣ ለማድረግ ይጠቅማል።



ምስል 4.2 ስታይል በአፍ የሚወሰድ የእርግዝና መከላከያ እንክብል

II. እርግዝናን የሚከላከለው እንዴት ነው?

- የሴቷ እንቁላል ከእንቁልጢ ተኮርታ (በስላ) እንዳትወጣ በማድረግ (ውጻትን በመከላከል)፤
- የማህፀን በር ፈሳሽን በማወፈር የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ማህፀን እንዳያልፍ በማገድ፤
- የማህፀን ግድግዳን በማሳሳት ከወንድ የዘር ፍሬ ጋር የተዋሀደች እንቁላል በማህፀን ግድግዳ ላይ ብታርፍ እንኳን ለፅንሱ ቀጣይ እድገት እንዳይመች በማድረግ እርግዝና እንዳይፈጠር ይከላከላል።

III. እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

አስተማማኝነቱ እንደ ተጠቃሚዎቹ የአጠቃቀም ሁኔታ ይወሰናል። ሴቷ የስታይል እንክብል የያዘውን አዲስ እሽግ ሶስት ቀናት እና ከዚያ በላይ ዘግይታ ከጀመረች ወይም የእንክብል እሽጉን በምትጀምርበት ወይም በምትጨርስበት ቀናት አካባቢ ለሶስት ቀናት እና ከዚያም በላይ የእርግዝና መከላከያ እንክብሉን ሳትወስድ ከቀረች እርግዝና የመከላከት እድሉ ከፍተኛ ነው።

በአብዛኛው ስታይልን ከሚጠቀሙ 100 ሴቶች በ8ቱ ላይ በመጀመሪያው ዓመት እርግዝና ሊከሰት ይችላል። ይህም ማለት ስታይልን ከሚጠቀሙ 100 ሴቶች ውስጥ 92 ለእርግዝና አይጋለጡም።

የስታይል እንክብል በትክክል ከተወሰደ እና አወሳሰዱ ላይ ችግር ከሌለ ደግሞ እንክብሉን ከሚጠቀሙ 1000 ሴቶች ውስጥ በመጀመሪያው ዓመት ውስጥ እርግዝና ሊከሰት የሚችለው በ 3ቱ ሴቶች ላይ ብቻ ነው። የስታይል እንክብል ስትጠቀም የነበረች ሴት እንክብሉን መውሰዷን በመተው ለማርገዝ ብትፈልግ ወዲያውኑ ማርገዝ ትችላለች።

ስታይል ኤች.አይ.ቪ./ኤድብን ጨምሮ ከማንኛውም ተላላፊ የአባላዘር በሽታዎች አይከላከልም።

ስታይል ከሴቶች የተፈጥሮአዊ ወር አበባ ዑደት ጋር እንዲመሳሰል ተደርጎ የተለያየ የአካላዊ ቅመም ይዘት ካላቸው እንክብሎች የተዘጋጀ በመሆኑ እርግዝናን ከመከላከል በተጨማሪ የወር አበባ መዛባትን ለማስተካከል መጠቀም ይቻላል።

IV. የጎንዮሽ ችግሮች

- በወር አበባ ላይ የሚከሰቱ ለውጦች
 - ለምሳሌ፡- የወር አበባ መጠን መቀነስ፣ ወር አበባ የሚፈሰባቸው ቀናት ማነስ
 - የወር አበባ መዛባት
 - በወር ውስጥ በማንኛውም ቀን የሚከሰት የደም መፍሰስ
 - የወር አበባ መቅረት
- መጠነኛ የራስ ምታት
- ድብርት
- ማቅለሽለሽ (በአብዛኛው ከ2-3 ወራት ጊዜ ውስጥ ይህ ስሜት ይጠፋል)
- የጡት መደደር
- መጠነኛ የኩብደት መጨመር ወይም መቀነስ
- የስሜት መለዋወጥ
- ብጉር (ሊባባስ ወይም ሊቀንስ የሚችል ሲሆን በአብዛኛው ግን ይቀንሳል)

V. ስታይል የሚያስገኛቸው ጤና ነክ ጥቅሞች

ስታይል እርግዝናን ከመከላከል በተጨማሪ የሚከተሉትን የጤና ችግሮች ለመከላከል ይረዳል፡-

የማህፀን ግድግዳ ካንሰር

የእንቁልጢ ካንሰር

የማህፀን ቁስለት

ከወር አበባ መዛባት እና መብዛት ጋር የተያያዙ የደም ማነስ ችግሮችን

የሚከተሉትን ደግሞ ይቀንሳል፡-

በወር አበባ ጊዜ የሚከሰተውን የሆድ ቁርጠት

በዉዳት ጊዜ የሚፈጠር የህመም ስሜት

በሰውነት ወይም በፊት ላይ የጸጉር መብዛትን እና ብጉር

አንዳንድ ሴቶች ለምን ስታይልን ይመርጣሉ?

እንክብሉ በሴቷ ቁጥጥር ስር ያለ መሆኑ

ያለ ጤና ባለሙያ እርዳታ በማንኛውም ሰዓት ማቋረጥ መቻሉ

በግብረ ስጋ ግንኙነት መሐል አለማስተጓጎሉ

VI. ስታይል ሊያስከትላቸው የሚችሉ የጤና ችግሮች

የመከሰት እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም

በእግር የደም ስሮች እና በሳንባ ውስጥ የደም መርጋት ሊያስከትል ይችላል።

የመከሰት እድላቸው እጅግ በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም

በጭንቅላት ውስጥ የሚከሰት የደም መርጋት እና

ድንገተኛ የልብ ህመም ሊያስከትል ይችላል።

VII. ስለ ስታይል ማወቅ እና መገንዘብ ያለብን

ስታይል፡

ምንም እንኳን ስታይል በየቀኑ የሚወሰድ እንክብል ቢሆንም በሴቷ ሰውነት ውስጥ የሚኖረው የሆርሞኑ መጠን እየጨመረ ስለማይሄድ ሴቷ ስታይልን ማቋረጥ የለባትም።

ሴቷ በዚያ ቀን የግብረ ስጋ ግንኙነት ብታደርግም ባታደርግም እንክብሉን በየቀኑ መውሰድ አለባት።

ስታይል፡

ሴቶች መካን እንዲሆኑ አያደርግም

ሴቶች አካለ ጎዶሎ ወይም መንታ ልጅ እንዲወልዱ አያደርግም

በሴቶች የግብር ስጋ ግንኙነት ፍላጎት ላይ ምንም ዓይነት ለውጥ አያስከትልም
በየቀኑ ስለሚሟሟ በጨጓራ ወይም በሰውነት ውስጥ አይከማችም
ነፍስ ጡር ሴት ማርገዟን ሳታውቅ ብትወስደው በእርግዝና ላይ ምንም ዓይነት ችግር አያስከትልም

VIII. ስታይልን መጠቀም የሚችሉት የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

ስታይል በአጠቃላይ ለሁሉም ሴቶች ተስማሚ እና ምቹ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ነው። ስታይልን መጠቀም የሚችሉ ሴቶች፡-

- ልጅ ያላቸው ወይም የሌላቸው
- ያገቡ ወይም ያላገቡ
- አፍላ ወጣቶች እና ከ40 አመት በላይ የሆናቸው ሴቶችን ጨምሮ በማንኛውም የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶች
- ፅንሰ ያቋረጠች ወይም ያስወረዳት ሴት
- የደም ማነስ ያለባቸው ወይም በፊት የነበረባቸው ሴቶች
- የፀረ ኤች አይ ቪ መድሀኒት ቢወስዱም ባይወስዱም ኤች አይ ቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሴቶች ስታይልን በአስተማማኝነት መጠቀም ይችላሉ።

ሴቶች ስታይልን ፡

ምንም የማህፀን በር እና የማህፀን አካባቢ ምርመራ እንዲሁም
ምንም ዓይነት የላቦራቶሪ ምርመራ ሳያደርጉ ለእርግዝና መከላከያነት መጠቀም መጀመር ይችላሉ።

ስታይል የኤች አይ ቪ ቫይረስ ላለባቸው ሴቶች

ኤች አይ ቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለ ወይም የፀረ ኤች አይ ቪ መድሀኒት ህክምና የሚወስዱ ሴቶች ስታይልን መጠቀም ይችላሉ።

እነዚህን ሴቶች ከስታይል ጋር በጥምረት ኮንዶም እንዲጠቀሙ ማበረታታት ያስፈልጋል። ኮንዶም በትክክል እና በዘላቂነት ከተጠቀምነው የአባላዘር በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳል። ኮንዶም የፀረ ኤች አይ ቪ መድሀኒት ህክምና ለሚወስዱ ሴቶች እንደ ተጨማሪ የእርግዝና መከላከያም ያገለግላል ። የፀረ ኤች አይ ቪ መድሀኒቶች የስታይልን የእርግዝና መከላከል አስተማማኝነት መቀነስ አለመቀነሳቸው በጥናት አልተረጋገጠም።

IX. ስታይልን መጠቀም የማይችሉት የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

- ያረገዘች ወይም እንዳረገዘች የምትጠረጠር ሴት
- በሳንባ ውስጥ የደም መርጋት ካለ ወይም ከነበረ
- ከዚህ በፊት በጭንቅላት እና የደም ስሮች ላይ የደረሰ አደጋ ከነበረ
- የልብ እና የልብ ቧንቧ ህመም ካለ ወይም ከነበረ
- ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ያለባቸው ሴቶች
- ከደም ዑደት ጋር የተቆራኘ የሰኳር በሽታ ካለ
- ከነርቭ ጋር የተያያዘ የራስ ምታት ካለ
- ከፍተኛ የቀዶ ጥገና ደረገች ሴት
- የጡት ካንሰር ካለ
- የጉበት ካንሰር ካለ
- የጉበት ህመም ችግር ካለ
- በቀን ከ15 ሲጋራዎች በላይ የሚያጨሱ እና ዕድሜያቸው ከ35 ዓመት በላይ የሆነ ሴቶች እና
- እንክብሉ የተሰራበት ንጥረነገሮች እንደማይስማማት የተረጋገጠ ሴት

X. የስታይል እርግዝና መከላከያ እንክብል የአወሳሰድ መመሪያ

<p>የመጀመሪያው እንክብል አወሳሰድ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ በእያንዳንዱ የስታይል ካርቶን እሽግ ውስጥ ሶስት ባለ21 እንክብል እሽጎች የሚገኙ ሲሆን፤ እነዚህ እሽጎች አንዱ ለአንድ የወር አበባ ዑደት የሚያገለግል የሶስት ተከታታይ ወራት የእርግዝና መከላከያ እንክብሎችን ይዘዋል። ➢ ስታይል የእርግዝና መከላከያ እንክብልን መጠቀም ለመጀመር ሁለት አማራጮች አሉ፡- <ul style="list-style-type: none"> ሀ. የሚቀጥለው የወር አበባ እስኪመጣ በመጠበቅ የመጀመሪያውን እንክብል በመጀመሪያው የወር አበባ ቀን መውሰድ። ቀጣዮቹን እንክብሎች በመመሪያው መሠረት በቀን አንድ ፍሬ መውሰድ መቀጠል። ለ. የመጀመሪያውን እንክብል በማንኛውም ቀን መውሰድ በመጀመር ቀጣዮቹን እንክብሎች በመመሪያው መሠረት በቀን አንድ ፍሬ መውሰድ መቀጠል። ሆኖም ግን ይኸኛው አማራጭ ከተወሰደ እንክብሉ ከተጀመረበት ቀን አንስቶ ለመጀመሪያዎቹ 7 ተከታታይ ቀናት መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን በተጨማሪነት መጠቀም ያስፈልጋል። ➢ የመጀመሪያውን እንክብል ለመውሰድ እንክብሎችን ከያዘው ከአንዱ እሽግ ውስጥ ከእሽጉ በስተጀርባ በግራ እጅ በኩል ከላይ ጫፍ የሚገኘውን 1ኛ ተራ ቁጥር የተጻፈበትን እንክብል መዋጥ፤ ➢ ከዚያም የቀሩትን እንክብሎች ለመውሰድ በእሽጉ ላይ ያሉትን የቁጥር ቅደም ተከተል ወይም አቅጣጫ ጠቋሚ ቀሰቶች መከተል።
<p>ስለ እንክብል አወሳሰዱ አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ እንክብል የያዘው እሽግ ባዶ እስኪሆን ድረስ በየቀኑ አንድ እንክብል በተመሳሳይ ሰዓት መዋጥ። ➢ በተቻለ መጠን እያንዳንዱን እንክብል በተመሳሳይ ጊዜ መውሰድ ተጠቃሚዎች እንክብሎችን ለመዋጥ እንዳይረሱ ያግዛቸዋል። እንዲሁም የተወሰኑ የጎንዶሽ ችግሮችን ይቀንሳል።
<p>አንዱ እንክብሎችን የያዘውን እሽግ ሲጨረስ የሚቀጥለው እሽግ እንዴት እንደሚጀመር</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ሴቷ አንዱን እንክብል የያዘ እሽግ እንደጨረሰች ከቀጣዩ እሽግ የመጀመሪያዋን እንክብል ከሰሳት ቀናት በኋላ መውሰድ ይኖርባታል። የሚቀጥላውን እሽግ ዘግይቶ መጀመር እርግዝና ሊያስከትል ይችላል።

<p>እንክብሉን ቢታዘዘው መሠረት በወቅቱ አለመውሰድ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ እንክብሉ በየዕለቱ በተመሳሳይ ሰዓት አንድ ፍሬ ሳይወሰድ ከቀረ እርግዝናን የመከላከል ኃይሉ ይቀንሳል። ➤ ሴቷ እንክብሉን የመውሰጃ ሰዓቷ ካለፈ በኋላ ብታስታውስ ወዲያውኑ የዘነጋችውን እንክብል መውሰድ ይኖርባታል። ➤ ሴቷ በዕለቱ መውሰድ የሚገባትን እንክብል አለመውሰዷን በነጋታው ብታስታውስ ሁኔታውን ባስታወሰችበት ቀን የሁለቱን ቀናት ሁለት እንክብሎች አንድ ላይ መውሰድ ይኖርባታል። ➤ ሴቷ በወር ውስጥ ሶስቱ እና ከዚያ በላይ እንክብሉን ሳትወስድ ከቀረች ወይም እንክብሉን የያዘውን እሽግ ሶስት ቀንና ከዚያ በላይ ዘግይታ ከጀመረች እርግዝና የመከሰት ዕድሉ ከፍተኛ ስለሚሆን መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን በተጨማሪነት መጠቀም ያስፈልጋታል። ➤ ሴቷ በወር አበባ ዑደቷ ሶስተኛ ሳምንት ላይ ሶስት ወይም ከዚያ በላይ እንክሎችን ሳትወስድ ከቀረች የሚቀጥለውን እሽግ ለመጀመር መጠበቅ የነበረባትን የሰባት ቀን ጊዜ በመተው እየወሰደችው የነበረው እሽግ እንዳለቀ በቀጥታ የሚቀጥለውን እሽግ በነጋታው መውሰድ መጀመር ይኖርባታል። ➤ ሴቷ የእርግዝና መከላከያ እንክብሉን በወሰደች በ2 ሰዓታት ውስጥ ካስመለሳት በተቻለ ፍጥነት የእርግዝና መከላከያ እንክብሎቹን ከያዘው እሽግ ውስጥ ሌላ እንክብል መውሰድና ቀሪውን እንደበፊቱ በቀጣይነት መውሰድ ይኖርባታል።
<p>መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ስለመጠቀም</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ሴቷ ዘንግታ ወይም በሌላ ምክንያት እንክብሉን ሳትወስድ ብትቀር ሌላ መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ መጠቀም ያስፈልጋታል። ➤ መጠባበቂያ የእርግዝና ዘዴዎች የምንላቸው ከሩካቤ መታቀብ፣ የወንድ ወይም የሴት ኮንዶም መጠቀም፣ ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያዎችን መጠቀም፣ የወንዱን ዘር ፍሬ የሚገድሉ ቅባቶች መጠቀም እና የወንዱን የዘር ፍሬ ወደ ውጭ የማፍሰስ ዘዴ ናቸው። ➤ የወንዱን ዘር ፍሬ የሚገድሉ ቅባቶች እና የወንዱን የዘር ፍሬ ወደ ውጭ ማፍሰስ ዝቅተኛ የእርግዝና መከላከል ውጤት ሲኖራቸው፤ ኮንዶም መጠቀም እና ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያዎችን መጠቀም ደግሞ የተሻለ አስተማማኝ የእርግዝና መከላከል ብቃት አላቸው።

4.3 አይፕላን

I. አይፕላን ምንድን ነው?

አይፕላን በአፍ የሚወሰድ ባለነጠላ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ እንክብል ሲሆን፤ የተሰራውም በተፈጥሮ በሴቶች አካል ውስጥ የሚመረተውን ፕሮጀስቲቮን አካላዊ ቅመም (ሆርሞን) ከሚመሳሰል በጣም ዝቅተኛ መጠን ካለው ፕሮጀስቲቮን የተባለ በሳይንሳዊ መንገድ የተፈበረከ ንጥረ ነገር ነው።

እያንዳንዱ የአይፕላን እሽግ ባለ 28 ፍሬ ሲሆን፤ ይዘታቸው ሌቮኖርጀስትሪል 0.03 ሚ.ግ የሆነ ነጭ የእርግዝና መከላከያ እንክብሎችን ይይዛል።

አይፕላን ለሚያጠቡ እናቶች እርግዝናን ለመከላከል ይጠቅማል።



ምስል 4.3 አይፕላን በአፍ የሚወሰድ የእርግዝና መከላከያ እንክብል

II. እርግዝናን የሚከላከለው እንዴት ነው?

- የሴቷ እንቁላል ከእንቁልጢ ተኮርታ (በስላ) እንዳትወጣ በማድረግ (ውጻትን በመከላከል)፤
- የማህፀን በር ፈሳሽን በማወፈር የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ማህፀን እንዳያልፍ በማገድ፤
- ያኮረተችዋን እንቁላል እና/ወይም የወንድ የዘር ፍሬ የጉዞ እንቅስቃሴ በማዘግየት እርግዝና እንዳይፈጠር ይከላከላል።

III. እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

አስተማማኝነቱ እንደ ተጠቃሚዎቹ የአጠቃቀም ሁኔታ ይወሰናል። የወር አበባቸው በየወሩ ለሚመጣ እና

አይፕላንን ለእርግዝና መከላከያ ለሚጠቀሙ ሴቶች አይፕላን ሙሉ በሙሉ ካልተወሰደ ወይም መወሰድ ካለበት ጊዜ ዘግይቶ ከተወሰደ እርግዝና የመከሰት ዕድሉ ከፍተኛ ነው። አይፕላንን ከሚጠቀሙ የሚያጠቡ እናቶች መካከል በመጀመሪያው ዓመት እርግዝና የመከሰት እድሉ 0.5% ነው።

የአይፕላን እንክብል ስትጠቀም የነበረች ሴት እንክብሉን መውሰዷን በመተው ለማርገዝ ብትፈልግ ወዲያውኑ ማርገዝ ትችላለች።

አይፕላን ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ ከማንኛውም ተላላፊ የአባላዘር በሽታዎች አይከላከልም።

IV. የጎንዮሽ ችግሮች

- በወር አበባ ላይ የሚከሰቱ ለውጦች

ለምሳሌ:- የወር አበባ መዛባት

ለሚያጠቡ እናቶች የወር አበባ ዘግይቶ መምጣት

የወር አበባ ሙብዛት

በወር ውስጥ በማንኛውም ቀን የሚከሰት የደም መፍሰስ

የወር አበባ መቅረት

- ህመም ያለው የወር አበባ
- መጠነኛ የራስ ምታት
- ድብርት
- ማቅለሽለሽ (በአብዛኛው ከ2-3 ወራት ጊዜ ውስጥ ይህ ስሜት ይጠፋል)
- ማስመለስ
- የሆድ ቁርጠትና የሆድ መነፋት
- የጡት መደደር
- መጠነኛ የክብደት መጨመር ወይም መቀነስ

ምንም እንኳን አይፕላን ከመጠቀም ጋር የጎንዮሽ ችግሮች የመከሰት አጋጣሚው ከፍተኛ ቢሆንም በአብዛኛው የከፋ የጤና ጉዳት አያስከትልም። ሆኖም ግን አይፕላን ሲወሰድ የሚከተሉት የጎንዮሽ ችግሮች ከተከሰቱ በአስቸኳይ የጤና ባለሙያ እርዳታ ማግኘት ያስፈልጋል

- የሠውነት ቆዳ ወይም ዐይን ወደቢጫነት ከተቀየረ
- በጣም ከፍተኛ ወይም የማያቋርጥ የደም መፍሰስ ካለ
- የእርግዝና ተመሳሳይ ስሜት ወይም ከፍተኛ የሆድ ህመም ስሜት ካለ

V. አይፕላን የሚያስገኛቸው ጤና ነክ ጥቅሞች

አይፕላን

ጡት ለሚያጠቡ እናቶች ከሌሎች በአፍ ከሚወሰዱ ባለጥምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ እንክብሎች ይልቅ ተመራጭ ነው። ሴቷ በወለደች ከስድስተኛው ሳምንት ጀምሮ አይፕላንን መጠቀም ትችላለች።

ከኢስትሮጅን ጋር ተያያዥ የሆኑ የጎንዮሽ ችግሮችን አያስከትልም

አይፕላን እርግዝናን ከመከላከል በተጨማሪ የሚከተሉትን የጤና ችግሮች ለመከላከል ይረዳል፡-

የማህፀን ግድግዳ ካንሰር

የእንቁልጢ ካንሰር

የማህፀን ቁስለት

አንዳንድ ሴቶች ለምን አይፕላንን ይመርጣሉ?

እንክብሉ በሴቷ ቁጥጥር ስር ያለ መሆኑ

ያለ ጤና ባለሙያ እርዳታ በማንኛውም ሰዓት ማቋረጥ መቻሉ

በግብረ ስጋ ግንኙነት መሐል አለማስተጓጎሉ

VI. አይፕላን ሊያስከትላቸው የሚችሉ የጤና ችግሮች

የመከሰት እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም

የሰውነት ቆዳና የዓይን ቀለምን ቢጫ የሚያደርግ የጉበት በሽታ

ራስ ከፍሎ የሚያም ከባድ የራስ ምታት

የደም ግፊት መጨመር

በእግር የደም መልስ ስሮች ላይ እብጠት መጨመር

የመከሰት እድላቸው እጅግ በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም

የጉበት በሽታ

የሐምት ከረጢት በሽታ ሊያስከትል ይችላል።

በተጨማሪም ከማህፀን ውጪ የሚከሰቱ እርግዝናዎች የፕሮጀስቲቭ ሆርሞንን ብቻውን በሚወስዱ

ሴቶች ዘንድ የመከሰት ዕድሉ ከፍተኛ ነው።

VII. ስለ አይፕላን ማወቅ እና መገንዘብ ያለብን

አይፕላን፡

- ❖ የጡት ወተትን አይቀንስም። በጡት ወተት ብዛትም ሆነ ጥራት ላይ የሚያስከትለው ምንም ዓይነት ለውጥ የለም።
- ❖ ሴትዮዋ በዚያ ቀን የግብረ ስጋ ግንኙነት ብታደርግም ባታደርግም በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት

- ሳይቋረጥ መወሰድ አለበት
- ❖ ሴቶች መካን እንዲሆኑ አያደርግም
- ❖ ጡት በሚጠቡ ህፃናት ላይ ተቆማጥ አያመጣም

VIII. አይጥላን የእርግዝና መከላከያ ዘዴን መጠቀም የሚችሉት የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

አይጥላን በአጠቃላይ ለሁሉም ሴቶች ተስማሚ እና ምቹ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ነው። አይጥላንን መጠቀም የሚችሉ ሴቶች፡-

- ❖ ጡት የሚያጠቡ ሴቶች (ልጅ ከወለዱ ከሰድስተኛ ሳምንት ጀምሮ)
- ❖ ልጅ ያላቸው ወይም የሌላቸው
- ❖ ያገቡ ወይም ያላገቡ
- ❖ አፍላ ወጣቶች እና ከ40 አመት በላይ የሆናቸው ሴቶችን ጨምሮ በማንኛውም የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶች
- ❖ በማንኛውም የዕድሜ ክልል ያሉ ሲጋራ የሚያጨሱ ሴቶች
- ❖ ፅንሰ ያቋረጠች ወይም ያስወረዳት ሴት
- ❖ የደም ማነስ ያለባቸው ወይም በፊት የነበረባቸው ሴቶች
- ❖ የፀረ-ኤች አይ ቪ መድሀኒት ቢወስዱም ባይወስዱም የኤች አይ ቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሴቶች አይጥላንን መጠቀም ይችላሉ።

አይጥላን የኤች አይ ቪ ቫይረስ ላለባቸው ሴቶች

- ❖ ኤች አይ ቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለ ወይም የፀረ ኤች አይ ቪ መድሀኒት ህክምና የሚወስዱ ሴቶች አይጥላንን መጠቀም ይችላሉ።
- ❖ እነዚህን ሴቶች ከአይጥላን ጋር በጥምረት ኮንዶም እንዲጠቀሙ ማበረታታት ያስፈልጋል። ኮንዶም በትክክል እና በዘላቂነት ከተጠቀምነው የአባላዘር በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳል። ኮንዶም የፀረ ኤች አይ ቪ መድሀኒት ህክምና ለሚወስዱ ሴቶች እንደ ተጨማሪ የእርግዝና መከላከያም ያገለግላል ። የፀረ ኤች አይ ቪ መድሀኒቶች የአይጥላንን የእርግዝና መከላከል አስተማማኝነት መቀነስ አለመቀነሳቸው በጥናት አልተረጋገጠም።

IX. አይጥላንን መጠቀም የማይችሉት የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

- ያረገዘች ወይም እንዳረገዘች የምትጠረጠር ሴት
- የጉበት ህመም ካለ
- ጉበት መደበኛ ስራውን በትክክል ማከናወን የማይችልበት ሁኔታ ላይ ካለ
- መንስኤው ያልታወቀ የማህፀን መድማት ችግር ካለ

- የደም መርጋትና ከደም መርጋት ጋር የተቆራኘ የውስጥ ደዌ ችግር ካለ
- ከፍተኛ የደም ግፊት ካለ
- ከፍተኛ የራስ ህመም ወይም ጭንቅላትን ከፍሎ የሚያም የራስ ምታት ካለ ወይም ከነበረ
- እንክብሉ የተሰራበት ንጥረነገሮች እንደማይሰማማት የተረጋገጠ ሴት

VIII. የአይፕላን እርግዝና መከላከያ እንክብል የአወሳሰድ መመሪያ

<p>የመጀመሪያው እንክብል አወሳሰድ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ በእያንዳንዱ የአይፕላን ካርቶን እሽግ ውስጥ ሶስት ባለ28 እንክብል እሽጎች የሚገኙ ሲሆን፤ እነዚህ እሽጎች አንዱ ለአንድ የወር አበባ ዑደት የሚያገለግል የሶስት ተከታታይ ወራት የእርግዝና መከላከያ እንክብሎችን ይዘዋል። ➢ አይፕላን የእርግዝና መከላከያ እንክብልን መጠቀም ለመጀመር ሁለት አማራጮች አሉ፡- <ul style="list-style-type: none"> ሀ. የሚቀጥለው የወር አበባ እስኪመጣ በመጠበቅ የመጀመሪያውን እንክብል በመጀመሪያው የወር አበባ ቀን መውሰድ። ቀጣዮቹን እንክብሎች በመመሪያው መሠረት በቀን አንድ ፍሬ መውሰድ መቀጠል። ለ. የመጀመሪያውን እንክብል በማንኛውም ቀን መውሰድ በመጀመር ቀጣዮቹን እንክብሎች በመመሪያው መሠረት በቀን አንድ ፍሬ መውሰድ መቀጠል። ሆኖም ግን ይህንኛው አማራጭ ከተወሰደ እንክብሉ ከተጀመረበት ቀን አንስቶ ለመጀመሪያዎቹ 7 ተከታታይ ቀናት መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን በተጨማሪነት መጠቀም ያስፈልጋል። ➢ የመጀመሪያውን እንክብል ለመውሰድ እንክብሎቹን ከያዘው ከአንዱ እሽግ ውስጥ ከእሽጉ በስተጀርባ በግራ እጅ በኩል ከላይ ጫፍ የሚገኘውን የመጀመሪያውን እንክብል መዋጥ፤ ➢ ከዚያም የቀሩትን እንክብሎች ለመውሰድ በእሽጉ ላይ ያሉትን አቅጣጫ ጠቋሚ ቀስቶች መከተል።
<p>ስለ እንክብል አወሳሰዱ አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ እንክብል የያዘው እሽግ ባዶ እስኪሆን ድረስ በየቀኑ አንድ እንክብል በተመሳሳይ ሰዓት መዋጥ። ➢ በተቻለ መጠን እያንዳንዱን እንክብል በተመሳሳይ ጊዜ መውሰድ ተጠቃሚዎች እንክብሎችን ለመዋጥ እንዳይረሱ ያግዛቸዋል። እንዲሁም የተወሰኑ የጎንዩሽ ችግሮችን ይቀንሳል። ➢ ጡት ማጥባት ላቆመች ሴት አይፕላን እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ ከሌሎቹ ባለጥምር አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች ጋር ሲነፃፀር ዝቅተኛ ነው። ሆኖም ግን ሴቷ አይፕላንን መውሰድ ምቹ ሆኖ ካገኘችው ጡት ማጥባት ካቆመች በኋላም እንክብሉን መጠቀም መቀጠል ትችላለች።

<p>አንዱ እንክብሎቹን የያዘውን እሽግ ሲጨረስ የሚቀጥለው እሽግ እንዴት እንደሚጀመር</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ሴቷ አንዱን እንክብል የያዘ እሽግ እንደጨረሰች በሚቀጥለው ቀን ከቀጣዩ እሽግ የመጀመሪያዋን እንክብል መውሰድ አለባት። እሽጉን ዘግይቶ መጀመር እርግዝና ሊያስከትል ይችላል።
<p>እንክብሉን በታዘዘው መሠረት በወቅቱ አለመውሰድ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ እንክብሉ በየዕለቱ በተመሳሳይ ሰዓት አንድ ፍሬ ሳይወሰድ ከቀረ እርግዝናን የመከላከል ኃይሉ ይቀንሳል። ➤ ሴቷ እንክብሉን የመውሰጃ ሰዓቷ ካለፈ በኋላ ብታስታውስ ወዲያውኑ የዘነጋችውን እንክብል መውሰድ ይኖርባታል። በተጨማሪም የድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ መጠቀም አለባት። ➤ ሴቷ በዕለቱ መውሰድ የሚገባትን እንክብል አለመውሰዷን በነጋታው ብታስታውስ ሁኔታውን ባስታወሰችበት ቀን የሁለቱን ቀናት ሁለት እንክብሎች አንድ ላይ መውሰድ ይኖርባታል። ➤ የወር አበባ ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣ ከሆነ ለቀጣይ 2 ቀናት መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን መጠቀም አለባት። በተጨማሪም ባለፉት 3 ቀናት ውስጥ የግብረ ስጋ ግንኙነት አድርጋ ከነበረ የድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ መጠቀም አለባት። ➤ ሴቷ የእርግዝና መከላከያ እንክብሉን በወሰደች በ2 ሰዓታት ውስጥ ካስመለሳት በተቻለ ፍጥነት የእርግዝና መከላከያ እንክብሎቹን ከያዘው እሽግ ውስጥ ሌላ እንክብል መውሰድና ቀሪውን እንደበፊቱ በቀጣይነት መውሰድ ይኖርባታል።
<p>መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ስለመጠቀም</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ሴቷ ዘንግታ ወይም በሌላ ምክንያት እንክብሉን ሳትወስድ ብትቀር ሌላ መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ መጠቀም ያስፈልጋታል። ➤ መጠባበቂያ የእርግዝና ዘዴዎች የምንላቸው ከሩካቤ መታቀብ፣ የወንድ ወይም የሴት ኮንዶም መጠቀም፣ ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያዎችን መጠቀም፣ የወንዱን ዘር ፍሬ የሚገድሉ ቅባቶች መጠቀም እና የወንዱን የዘር ፍሬ ወደ ውጭ የማፍሰስ ዘዴ ናቸው። የወንዱን ዘር ፍሬ የሚገድሉ ቅባቶች እና የወንዱን የዘር ፍሬ ወደ ውጭ ማፍሰስ ዝቅተኛ የእርግዝና መከላከል ውጤት ሲኖራቸው፤ ኮንዶም መጠቀም እና ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያዎችን መጠቀም ደግሞ የተሻለ አስተማማኝ የእርግዝና መከላከል ብቃት አላቸው።

4.4 ፖስት-ፒል (የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ እንክብል)

I. ፖስት-ፒል ምንድን ነው?

ፖስት-ፒል በአፍ የሚወሰድ ያልተፈለገ እና ድንገተኛ እርግዝና መከላከያ እንክብል ነው። የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ዘዴ በማስገደድ ወይም አጋጣሚ በሆነ ምክንያት በተከናወነ ወይም ጥንቃቄ በጎደለው የግብረሰጋ ግንኙነት ሳቢያ ሊከሰት የሚችለውን ያልተፈለገ እርግዝና የግብረሰጋ ግንኙነት በተፈጠረ በ72 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ ለመከላከል የሚጠቅም ነው።

ፖስት-ፒል ባለጠላ አካላዊ ቅመም የያዘ ሲሆን የተሰራውም በሴቶች አካል ውስጥ በተፈጥሮ ከሚመረተው ፕሮጀስቲቮን አካላዊ ቅመም (ሆርሞን) ጋር ከሚመሳሰል ፕሮጀስቲቮን ከሚባል ንጥረነገር ነው። እያንዳንዱ የፖስት-ፒል እሽግ በውስጡ ሁለት ባለ 0.75 ሚ.ግ ሌቮኖርጂስትሪል እንክብሎች ይዟል።



ምስል 4.4 ፖስት-ፒል (የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ እንክብል)

II. ፖስት-ፒል እርግዝናን የሚከላከለው እንዴት ነው?

- የሴቷ እንቁላል ከእንቁልጢ ተኮርታ (በሰላ) እንዳትወጣ በማድረግ፤
- የማህፀን በር ፈሳሽን በማወፈር የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ማህፀን እንዳያልፍ በማገድ፤
- ያኮረተችውን እንቁላል እና/ወይም የወንድ የዘር ፍሬ የጉዞ እንቅስቃሴ በማዘግየት እንዲሁም
- ከወንድ የዘር ፍሬ ጋር የተዋሀደች እንቁላል የምታርፍበትን የማህፀን ግድግዳ በማሳሳት ለፅንሰ-ቀጣይ እድገት እንዳይመች በማድረግ እርግዝና እንዳይፈጠር ይከላከላል።

III. ፖስት-ፒል እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ እንደ ተጠቃሚዎች አጠቃቀም ይለያያል። እንክብሉ ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ-ሰጋ ግንኙነት ከተፈጸመ በ72 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ መወሰድ አለበት። ጊዜው እየጨመረ ሲሄድ የመከላከል አቅሙ እየቀነሰ ስለሚሄድ የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን ወዲያውኑ መውሰድ ያስፈልጋል።

ፖስት-ፒል በማስገደድ ወይም አጋጣሚ በሆነ ምክንያት በተከናወነ ወይም ጥንቃቄ በጎደለው የግብረ ስጋ ግንኙነት ሳቢያ ሊከሰት የሚችለውን እርግዝና ለመከላከል የሚወሰድ እንክብል እንጂ በዘላቂነት የሚወሰድ መደበኛ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ አለመሆኑ መታወቅ ይኖርበታል።

ፖስት-ፒል ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ ከማንኛውም ተላላፊ የአባላዘር በሽታዎች አይከላከልም። ፖስት-ፒል ከመወሰዱ አስቀድሞ በተከሰተ ጽንሰ ላይ ምንም ዓይነት ውጤት የለውም። የፖስት-ፒል እንክብል ተጠቅማ የነበረች ሴት ለማርገዝ ብትፈልግ ወዲያውኑ ማርገዝ ትችላለች።

IV. የጎንዮሽ ችግሮች

- የወርአበባ መዛባት ለምሳሌ
 - እንክብሉ በተወሰደ ጥቂት ቀናት ውስጥ መጠነኛ የሆነ የደም መፍሰስ ሊከሰት ይችላል።
 - የወር አበባ ከሚጠበቅበት ጊዜ ቀድሞ ወይም ዘግይቶ ሊመጣ ይችላል።
- ማቅለሽለሽ
- ማስመለስ
- ከእምብርት ቢታች የሆድ ቁርጠት
- ድብርት / የመጫጫን ስሜት
- የድካም ስሜት / የሠውነት መዛል
- የራስ ምታት
- የጡት መደደር

እነዚህ ፖስት-ፒልን ከመውሰድ ጋር ተያይዘው የሚመጡ የጎንዮሽ ችግሮች ለህመሞቹ ማስታገሻ መድኃኒት በመውሰድ በቀላሉ ወይም በጥቂት ቀናት ውስጥ በራሳቸው ሊጠፉ የሚችሉ ናቸው።

V. ፖስት-ፒል የሚያስገኛቸው ጤና ነክ ጥቅሞች

ፖስት-ፒል ያልተፈለገ ድንገተኛ እርግዝና እንዳይከሰት ይከላከላል።

VI. ፖስት-ፒል ሊያስከትል የሚችለው የጤና ጉዳት

ፖስት-ፒል ሊያስከትለው የሚችል የጤና ችግር የለም።

VII. ስለ ፖስት-ፒል ማወቅ እና መገንዘብ ያለብን

ፖስት-ፒል

- የጽንሰ መቋረጥ አያስከትልም
- እርግዝና ከተከሰተ በፅንሱ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያስከትልም
- በተጠቃሚዎች ላይ የጤና ችግር አያስከትልም
- መካን አያደርግም
- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ ሌሎች የአባላዛር በሽታዎችን የማይከላከል በመሆኑ ፖስት-ፒል አለ በማለት ጥንቃቄ የሳይደለው የግብረሰጋ ግንኙነት መፈፀም ለነዚህ በሽታዎች ተጋላጭ ያደርጋል
- የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ላልተጠቀሙ ወይም የአጠቃቀም ስህተት የገጠማቸው ሴቶች ቢያረግዙ ሊወስዱት ይችሉ የነበረውን የጽንሰ መቋረጥ እርምጃ ይቀንሳል።

VIII. ፖስት-ፒልን መጠቀም የሚችሉት የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

ፖስት-ፒል በአጠቃላይ ለሁሉም ሴቶች ተስማሚና ምቹ የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ዘዴ ሲሆን እንክብሉን መጠቀም የማይችሉ ሴቶች

- ያረዘሹ ወይም እንዳረዘሹ የምትጠረጠሩ ሴት
- እንክብሉ የተሰራበት ዋና ንጥረነገር (ሌቮኖርጀስትሪል) እንደማይስማማት የተረጋገጠ ሴት
- መንስኤው ያልታወቀ ወይም ምንነቱ በምርመራ ያልተረጋገጠ የደም መፍሰስ ያላት ሴት
- ጥንቃቄ የሳይደለው የግብረሰጋ ግንኙነት ካደረገች 72 ሰዓታት ያለፉት ሴት
- የወር አበባዋ የዘገየባት ሴት
- ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ የጉበት ህመም ያለባት ሴት

XI. ፖስት-ፒልን እንዴትና መቼ ነው መጠቀም ያለብን?

የፖስት-ፒል እንክብል ከማንኛውም በማስገደድ ወይም አጋጣሚ በሆነ ምክንያት ከተከናወነ ወይም ጥንቃቄ ከሳይደለው የግብረ-ሰጋ ግንኙነት በኋላ በ72 ሰዓታት ውስጥ በአፍ መዋጥ ያለበት ሲሆን፤ ከ72ቱ ሰዓታት ጊዜ ውስጥ በተቻለ መጠን በፍጥነት በተወሰደ ቁጥር ውጤቱም የበለጠ ይጨምራል።

የመጀመሪያው እንክብል በተቻለ መጠን ወዲያውኑ መወሰድ ያለበት ሲሆን ሁለተኛው እንክብል ደግሞ የመጀመሪያው እንክብል በተወሰደ በ12 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ መወሰድ አለበት።

ፖስት-ፒል በሴቷ የወርአበባ ዑደት ውስጥ በማንኛውም ጊዜ መወሰድ ይችላል። የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን ሴቷ የወር አበባ እያየችም ቢሆን መውሰድ ትችላለች፤ ነገር ግን የወርአበባ መምጫው

ከሚጠበቅበት ጊዜ ከዘገየ እርግዝና ተፈጥሮ ሊሆን ስለሚችል እርግዝና አለመፈጠሩ እስካልተረጋገጠ ድረስ እንክብሉን መውሰድ አይመከርም ::

የፖስት-ፒል እንክብል በተወሰደ በሁለት ሰዓት ጊዜ ውስጥ ሴቷ ካስመለሳት ተጨማሪ እንክብል መውሰድ ሊያስፈልግ ይችላል::

ፖስት-ፒል ድንገተኛ እርግዝናን ለመከላከል የሚጠቅምባቸው ሁኔታዎች:

- ሴቷ ያለምንም ቅድመ-ዝግጅት እና ምንም ዓይነት የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ሳትጠቀም የግብረ-ስጋ ግንኙነት ከፈጸመች፤
- ሴቷ ተገዳ ወይም ተደፍራ ግብረ-ስጋ ግንኙነት ከፈጸመች፤
- ጥንዶች የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች በትክክል መጠቀም ሳይችሉ ሲቀሩ ለምሳሌ
 - ኮንዶም በአግባቡ ሳይጠቀሙ ቢቀሩ፤ ኮንዶም ቢጠጠስ ወይም ቢፈነዳ
 - ሴቷ ባለጥምር አካላዊ ሆርሞን የእርግዝና መከላከያ ዘዴ እየተጠቀመች ሶስት እንክብሎችን ሳትወስድ ከቀረች ወይም አዲሱን የእንክብል እሽግ ሶስት ቀናት እና ከዛ በላይ ዘግይታ ከጀመረች
 - በመርፌ የሚሰጠውን ባለነጠላ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ዘዴ የምትጠቀም ሴት በድጋሚ ለመውሰድ ሁለት ሳምንት እና ከዚያ በላይ ከዘገየች
 - በሴቷ ማህጸን ውስጥ የተቀመጠው የእርግዝና መከላከያ ከቦታው ከወጣ
 - የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ሴቷ ብልት ከመግባቱ በፊት ከሴቷ ብልት ውጪ እንደተፈለገው ማፍሰስ ሳይቻል ሲቀር

4.5. ፋሲል-ዋን (የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ እንክብል)

I. ፋሲል-ዋን ምንድን ነው?

ፋሲል-ዋን በአፍ የሚወሰድ ያልተፈለገ እና ድንገተኛ እርግዝና መከላከያ እንክብል ነው:: የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ዘዴ በማሰባሰብ ወይም አጋጣሚ በሆነ ምክንያት በተከናወነ ወይም ጥንቃቄ በጎደለው የግብረ ስጋ ግንኙነት ሳቢያ ሊከሰት የሚችለውን ያልተፈለገ እርግዝና የግብረ ስጋ ግንኙነት በተፈጠረ በ72 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ ለመከላከል የሚጠቅም ነው::

ፋሲል-ዋን ባለነጠላ አካላዊ ቅመም የያዘ ሲሆን የተሰራውም በሴቶች አካል ውስጥ በተፈጥሮ ከሚመረተው ፕሮጀስትሮን አካላዊ ቅመም (ሆርሞን) ጋር ከሚመሳሰል ፕሮጀስቲን ከሚባል ንጥረነገር ነው::

እያንዳንዱ የፋሲል-ዋን እሽግ በውስጡ አንድ ባለ 1.5 ሚ.ግ ሌቮኖርጂስትሪል እንክብል ይዟል::



ምስል፡ ፋሲል-ዋን የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ እንክብል

II. ፋሲል-ዋን እርግዝናን የሚከላከለው እንዴት ነው?

- የሴቲ እንቁላል ከእንቁልጢ ተኮርታ (በስላ) እንዳትወጣ በማድረግ፤
- የማህፀን በር ፈሳሽን በማወፈር የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ማህፀን እንዳያልፍ በማገድ፤
- ያኮረተችዋን እንቁላል እና/ወይም የወንድ የዘር ፍሬ የጉዞ እንቅስቃሴ በማዘግየት እንዲሁም
- ከወንድ የዘር ፍሬ ጋር የተሞላደች እንቁላል የምታርፍበትን የማህፀን ግድግዳ በማሳሳት ለፅንሱ ቀጣይ እድገት እንዳይመች በማድረግ እርግዝና እንዳይፈጠር ይከላከላል።

III. ፋሲል-ዋን እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ እንደ ተጠቃሚዎች አጠቃቀም ይለያያል። እንክብሉ ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ-ስጋ ግንኙነት ከተፈጸመ በ72 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ መወሰድ አለበት። ጊዜው እየጨመረ ሲሄድ የመከላከል አቅሙ እየቀነሰ ስለሚሄድ የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን ወዲያውኑ መውሰድ ያስፈልጋል።

ፋሲል-ዋን በማስገደድ ወይም አጋጣሚ በሆነ ምክንያት በተከናወነ ወይም ጥንቃቄ በጎደለው የግብረ ስጋ ግንኙነት ሳቢያ ሊከሰት የሚችለውን እርግዝና ለመከላከል የሚወሰድ እንክብል እንጂ በዘላቂነት የሚወሰድ መደበኛ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ አለመሆኑ መታወቅ ይኖርበታል።

ፋሲል-ዋን ኤች.ኤይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ ከማንኛውም ተላላፊ የአባላዘር በሽታዎች አይከላከልም።

ፋሲል-ዋን ከመወሰዱ አስቀድሞ በተከሰተ ጽንሰ ላይ ምንም ዓይነት ውጤት የለውም።

የፋሲል-ዋን እንክብል ተጠቅማ የነበረች ሴት ለማርገዝ ብትፈልግ ወዲያውኑ ማርገዝ ትችላለች።

IV የጎንዮሽ ችግሮች

- የወርአበባ መዛባት ለምሳሌ

- እንክብሉ በተወሰደ ጥቂት ቀናት ውስጥ መጠነኛ የሆነ የደም መፍሰስ ሊከሰት ይችላል።
- የወር አበባ ከሚጠበቅበት ጊዜ ቀድሞ ወይም ዘግይቶ ሊመጣ ይችላል።

- ማቅለሽለሽ
- ማስመለስ
- ከእምብርት በታች የሆድ ቁርጠት
- ድብርት / የመጫጫን ስሜት
- የድካም ስሜት / የሠውነት መዛል
- የራስ ምታት
- የጡት መደደር

እነዚህ ፋሲል-ዋንን ከመውሰድ ጋር ተያይዘው የሚመጡ የጎንዮሽ ችግሮች ለህመሞቹ ማስታገሻ መድኃኒት በመውሰድ በቀላሉ ወይም በጥቂት ቀናት ውስጥ በራሳቸው ሊጠፉ የሚችሉ ናቸው።

V. ፋሲል-ዋን የሚያስገኛቸው ጤና ነክ ጥቅሞች

ፋሲል - ዋን ያልተፈለገ ድንገተኛ እርግዝና እንዳይከሰት ይከላከላል።

VI. ፋሲል-ዋን ሊያስከትል የሚችለው የጤና ጉዳት

ፋሲል - ዋን ሊያስከትለው የሚችል የጤና ችግር የለም።

VII. ስለ ፋሲል-ዋን ማወቅ እና መገንዘብ ያለብን

ፋሲል-ዋን

- የጽንሰ መቋረጥ አያስከትልም
- እርግዝና ከተከሰተ በፀንሱ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያስከትልም
- በተጠቃሚዎች ላይ የጤና ችግር አያስከትልም
- መካን አያደርግም
- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ ሌሎች የአባላዛር በሽታዎችን የማይከላከል በመሆኑ ፋሲል-ዋን አለ በማለት ጥንቃቄ የጎደለው የግብረሰጋ ግንኙነት መፈፀም ለነዚህ በሽታዎች ተጋላጭ ያደርጋል
- የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ላልተጠቀሙ ወይም የአጠቃቀም ስህተት የገጠማቸው ሴቶች ቢያረጋገዙ ሊወስዱት ይችሉ የነበረውን የጽንሰ ማቋረጥ እርምጃ ይቀንሳል።

VIII. ፋሲል-ዋንን መጠቀም የማይችሉ የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

ፋሲል-ዋን በአጠቃላይ ለሁሉም ሴቶች ተስማሚና ምቹ የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ዘዴ ሲሆን እንክብሉን መጠቀም የማይችሉ ሴቶች

- ያረገዘች ወይም እንዳረገዘች የምትጠረጠር ሴት
- እንክብሉ የተሰራበት ዋና ንጥረነገር (ሌቮኖርጀስትሪል) እንደማይሰማማት የተረጋገጠ ሴት
- መንስኤው ያልታወቀ ወይም ምንነቱ በምርመራ ያልተረጋገጠ የደም መፍሰስ ያላት ሴት
- ጥንቃቄ የጎደለው የግብረሰጋ ግንኙነት ካደረገች 72 ሰዓታት ያለፋት ሴት
- የወርአበባ የዘገየባት ሴት
- ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ የጉበት ህመም ያለባት ሴት

IX. ፋሲል-ዋን እንዴትና መቼ ነው መወሰድ ያለበት?

የፋሲል-ዋን እንክብል ከማንኛውም በማስገደድ ወይም አጋጣሚ በሆነ ምክንያት ከተከናወነ ወይም ጥንቃቄ ከጎደለው የግብረ-ሰጋ ግንኙነት በኋላ በ72 ሰዓታት ውስጥ መወሰድ ያለበት ሲሆን፤ ከ72ቱ ሰዓታት ጊዜ ውስጥ በተቻለ መጠን በፍጥነት በተወሰደ ቁጥር ውጤቱም የበለጠ ይጨምራል።

ፋሲል-ዋን በሴቷ የወርአበባ ዑደት ውስጥ በማንኛውም ጊዜ መወሰድ ይችላል። የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን ሴቷ የወር አበባ እያየችም ቢሆን መውሰድ ትችላለች፤ ነገር ግን የወርአበባ መምጫው ከሚጠበቅበት ጊዜ ከዘገየ እርግዝና ተፈጥሮ ሊሆን ስለሚችል እርግዝና አለመፈጠሩ እስካልተረጋገጠ ድረስ እንክብሉን መውሰድ አይመከርም ።

የፋሲል-ዋን እንክብል በተወሰደ በሁለት ሰዓት ጊዜ ውስጥ ሴቷ ካስመለሳት ተጨማሪ እንክብል መውሰድ ሊያስፈልግ ይችላል።

ፋሲል-ዋን ድንገተኛ እርግዝናን ለመከላከል የሚጠቅምባቸው ሁኔታዎች፡

- ሴቷ ያለምንም ቅድመ-ዝግጅት እና ምንም ዓይነት የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ሳትጠቀም የግብረ-ሰጋ ግንኙነት ከፈጸመች፤
- ሴቷ ተገዳ ወይም ተደፍራ ግብረ-ሰጋ ግንኙነት ከፈጸመች፤
- ጥንዶች የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች በትክክል መጠቀም ሳይችሉ ሲቀሩ ለምሳሌ
 - ኮንዶም በአግባቡ ሳይጠቀሙ ቢቀሩ፤ ኮንዶም ቢጠጠስ ወይም ቢፈነዳ
 - ሴቷ ባለጥምር አካላዊ ሆርሞን የእርግዝና መከላከያ ዘዴ እየተጠቀመች ሶስት እንክብሎችን ሳትወስድ ከቀረች ወይም አዲሱን የእንክብል እሽግ ሶስት ቀናት እና ከዛ በላይ ዘግይታ ከጀመረች
 - በመርፌ የሚሰጠውን ባለነጠላ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ዘዴ የምትጠቀም ሴት በድጋሚ ለመውሰድ ሁለት ሳምንት እና ከዚያ በላይ ከዘገየች
 - በሴቷ ማህጸን ዉስጥ የተቀመጠው የእርግዝና መከላከያ ከበታዉ ከወጣ
 - የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ሴቷ ብልት ከመግባቱ በፊት ከሴቷ ብልት ውጪ እንደተፈለገው ማፍሰስ ሳይቻል ሲቀር

ምዕራፍ 5

በመርፌ መልክ የሚሰጥ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ኮንፌደንስ ዲፖደስቲን

I. ኮንፌደንስ ምንድን ነው?

ኮንፌደንስ በመርፌ መልክ የሚሰጥ የእርግዝና መከላከያ ሲሆን፤ የተሰራውም በተፈጥሮ በሴቶች አካል ውስጥ የሚመረተውን ፕሮጀስቲን ኦስትሮጅን (ሆርሞን) ከሚመሰሰል ፕሮጀስቲን የተባለ በሳይንሳዊ መንገድ የተፈጠረ ንጥረ ነገር ነው።

እያንዳንዱ የኮንፌደንስ ብልቃጥ ሜድሮክሲፕሮጀስቲን አሲቴት 150ሚግ/ሚሌ ይዟል። ኮንፌደንስ በጡንቻ ውስጥ በመርፌ ከተሰጠ በኋላ ሆርሞኑ በደም ስሮች ውስጥ ቀስበቀስ ይሰራጫል። ኮንፌደንስ በየሶስት ወሩ የሚሰጥ የእርግዝና መከላከያ ነው።

ኮንፌደንስ ጡት የሚያጠቡ እናቶችም ሊጠቀሙት የሚችሉ የእርግዝና መከላከያ ነው። ሆኖም ግን መሰጠት መጀመር ያለበት ከወለደች ስድስት ሳምንት እና ከዚያ በላይ ለሆናት የምታጠባ እናት ነው።



ምስል 5.1 ኮንፌደንስ ዲፖደስቲን በመርፌ መልክ የሚሰጥ የእርግዝና መከላከያ

II. እርግዝናን የሚከላከለው እንዴት ነው?

- የሴቷ እንቁላል ከእንቁልጢ ተኮርታ (በሰላ) እንዳትወጣ በማድረግ (ውጻትን በመከላከል)፤
- የማህፀን በር ፈሳሽን በማወፈር የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ማህፀን እንዳያልፍ በማገድ፤

- ያኮረተችዋን እንቁላል የጉዞ እንቅስቃሴ በማዘግየት እንዲሁም
- የማህፀን ግድግዳን በማሳሳት ከወንድ የዘር ፍሬ ጋር የተዋሀደች እንቁላል የማህፀን ግድግዳው ላይ ብታርፍ ለፅንሱ ቀጣይ እድገት እንዳይመችና ማህፀን ፅንሰ መሸከም እንዳይችል በማድረግ እርግዝና እንዳይፈጠር ይከላከላል።

III. እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

አስተማማኝነቱ እንደ ተጠቃሚዎቹ የአጠቃቀም ሁኔታ ይወሰናል። ኮንፌደንሽን ከሚጠቀሙ ሴቶች መካከል በመጀመሪያው ዓመት እርግዝና የመከሰት እድሉ 3% ነው። ኮንፌደንሽን ያለምንም ስህተት በትክክል ከሚጠቀሙ ሴቶች መካከል ደግሞ እርግዝና የመከሰት እድሉ 0.3% ብቻ ነው።

ኮንፌደንሽን ስትጠቀም የነበረች ሴት መርፌውን መውሰዷን በመተው ለማርገዝ ብትፈልግ እርግዝና ሳይከሰት እስከ አንድ ዓመት ድረስ ሊዘገይ ይችላል።

ኮንፌደንሽን ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ ከማንኛውም ተላላፊ የአባላዘር በሽታዎች አይከላከልም።

IV. የጎንዮሽ ችግሮች

- በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ወራት የወር አበባ መዛባት
 - የወር አበባ ወቅቱን ጠብቆ አለመምጣት
 - የወር አበባ ሉብዙ ቀናት መፍሰስ
 - በወር ውስጥ በማንኛውም ቀን የሚከሰት የደም መፍሰስ
 - የወር አበባ ሙብዛት (አልፎ አልፎ)
 - ወደ በኋላም የወር አበባ መቅረት
- የክብደት መጨመር
- ራስ ምታት
- ድብርት
- የሆድ መነፋት እና የህመም ስሜት
- የስሜት መቀያየር

ኮንፌደንሽን ከመሰጠቱ በፊት ስለሚፈጠረው የወር አበባ መዛባት እና ሌሎች የጎንዮሽ ችግሮች በቂ የሆነ ምክር ለሴቷ መሰጠት አለበት። ይህ ሴቷ ኮንፌደንሽን በቀጣይነት መጠቀሟን እንድትቀጥል ይረዳል።

V. ኮንፌደንሽን የሚያስገኛቸው ጤና ነክ ጥቅሞች

ኮንፌደንሽን እርግዝናን ከመከላከል በተጨማሪ የሚከተሉትን የጤና ችግሮች ለመከላከል ይረዳል፡-

- የማህፀን ግድግዳ ካንሰር
- የእንቁልጢ ካንሰር

የማህፀን መደንደንን

በተጨማሪም

የማህፀን ቁስለትን

የደም ማነስ ችግርን

የማህፀን ግድግዳ ቁስለት እና ምልክቶቹን እንዲሁም

የዳሌ ህመም እና መደበኛ ያልሆነ የደም መፍሰስን ይቀንሳል።

VI. ስለ ኮንፌደንስ ማወቅና መገንዘብ የሚገባን

ኮንፌደንስ

- የወር አበባን ሊያስቀር ይችላል። ይሁን እንጂ የወር አበባ መቅረቱ በእርግዝና ጊዜ ከሚቀረው የወር አበባ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ዓይነት እንጂ የሚያስከትለው ጉዳት የለም። ደሙም በሴቷ አካል ውስጥ አይጠራቀምም።
- እርግዝና እናዳለሳል ሳይታወቅ ቢሰጥ በእርግዝናው ላይ ምንም ዓይነት ጉዳት አያስከትልም
- ሴቶች መካን እንዲሆኑ አይደርግም
- የእርግዝና መከላከያ መርፌው እንደተሰጠ መርፌ የተወጋውን የሰውነት አካባቢ ማሻሻትና ጫን ብሎ መነካካት አያስፈልግም። ይህም ቀስ በቀስ ዘግይቶ መሰራጨት የነበረበትን የእርግዝና መከላከያ ቶሎ በፍጥነት እንዲሰራጭ በማድረግ እርግዝና የመከላከል ቆይታ ጊዜውን ሊያሳጥር ስለሚችል ነው።

VII. ኮንፌደንስን መጠቀም የሚችሉት የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

ኮንፌደንስ በአጠቃላይ ለሁሉም ሴቶች ተስማሚ እና ምቹ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ነው። ኮንፌደንስን መጠቀም የሚችሉ ሴቶች፡-

- ❖ ልጅ ያላቸው ወይም የሌላቸው
- ❖ ያገቡ ወይም ያላገቡ
- ❖ አፍላ ወጣቶች እና ከ40 አመት በላይ የሆናቸው ሴቶችን ጨምሮ በማንኛውም የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶች
- ❖ በማንኛውም የዕድሜ ክልል ያሉ ሲጋራ የሚያጨሱ ሴቶች
- ❖ ፅንሰ ያቋረጠች ወይም ያስወረዳት ሴት
- ❖ የደም ማነስ ያለባቸው ወይም በፊት የነበረባቸው ሴቶች
- ❖ ጡት የሚያጠቡ እናቶች (ልጅ ከወለዱ ከስድስተኛው ሳምንት ጀምሮ)
- ❖ የፀረ -ኤች አይ ቪ መድሀኒት ቢወስዱም ባይወስዱም የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሴቶች ኮንፌደንስን መጠቀም ይችላሉ።

ኮንፌደንስ ኤች.አይ.ቪ በደማቸው ውስጥ ላለባቸው ሴቶች

ኤች.አይ.ቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለ ወይም የፀረ ኤች.አይ.ቪ ህክምና መድሀኒት የሚወስዱ ሴቶች ኮንፌደንስን መጠቀም ይችላሉ። እነዚህን ሴቶች ከኮንፌደንሱ ጋር ኮንዶም በጥምረት እንዲጠቀሙ ማበረታታት ያስፈልጋል ።ኮንዶምን በዘላቂነት እና በትክክል ከተጠቀምን የአባላዘር በሽታዎችን ይከላከላል።

VIII. ኮንፌደንስን መጠቀም የማይችሉት የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

- ያረዘዘች ወይም እንዳረዘዘች የምትጠረጠር ሴት
- የጉበት ህመም ካለ
- ጉበት መደበኛ ስራውን በትክክል ማከናወን የማይችልበት ሁኔታ ላይ ካለ
- የሠውነት እና የዓይን ቆዳ ቀለምን ወደ ቢጫ የሚቀይር የጉበት በሽታ ካለ ወይም ከነበረ
- መንስኤው ያልታወቀ የማህፀን መድማት ችግር ካለ
- የጡት ካንሠር ካለ
- የስኳር በሽታ ካለ
- ከፍተኛ የራስ ህመም ወይም ጭንቅላትን ከፍሎ የሚያም የራስ ምታት ካለ ወይም ከነበረ
- ኮንፌደንስ የተሰራበት ንጥረነገሮች እንደማይስማማት የተረጋገጠ ሴት

XI. የኮንፌደንስ አሰጣጥ መመሪያ

<p>የመጀመሪያው ኮንፌደንስ አሰጣጥ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ኮንፌደንስ በሶስት ወር አንዴ በሴቷ የላይኛው ክንድ ጡንቻ ውስጥ በመርፌ የሚሰጥ የእርግዝና መከላከያ ነው። ➢ ኮንፌደንስን መጠቀም ለመጀመር የሚቀጥለው የወር አበባ እስኪመጣ መጠበቅ፤ ከዚያም የወር አበባ ከመጣ ጊዜ አንስቶ ባሉት 5 ቀናት ውስጥ የመጀመሪያውን ኮንፌደንስ የእርግዝና መከላከያ መስጠት። ➢ ኮንፌደንስን ለወለደች እናት መጠቀም ለመጀመር ሴቷ የሚታጠባ ከሆነ ከወለደች እስከ 5 ቀናት ባሉት ጊዜ ውስጥ የምታጠባ ከሆነ ደግሞ በወለደች በ6ኛው ሳምንት መስጠት።
<p>ከቀጠራቸው ዘግይተው ለሚመጡ ተጠቃሚዎች</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ኮንፌደንስ እስከ አራት ሳምንት ድረስ ዘግይቶ ሊሰጥ ይችላል። ሴቷ በቀጠሮቿ ቀን እንድትመጣ መንገር። ካልሆነ ግን ዘግይታም ቢሆን በማንኛውም ጊዜ እንድትመጣ ማስታወስ። ➢ ተጠቃሚዎች ከ4 ሳምንት ባነሰ ጊዜ ወስጥ ከመጣች ተጨማሪ ምርመራ ሳያስፈልግ ቀጣዩን የእርግዝና መከላከያ መርፌ መወሰድ ትችላላች። ➢ ከ4 ሳምንት በላይ ዘግይተው የሚመጡ ተጠቃሚዎች ቀጣዩን የእርግዝና መከላከያ መርፌ መወሰድ የሚችሉት፤ <ul style="list-style-type: none"> • የእርግዝና መከላከያ መርፌውን መወሰድ ከነበረባት ጊዜ አንስቶ እስከ ሁለት ሳምንት ጊዜ ድረስ ምንም አይነት የግብረሰጋ ግንኙነት ካላደረገች ወይም • ጥንቃቄ የጎደለው የግብረሰጋ ግንኙነት አድርጋ የድንገተኛ ጊዜ የእርግዝና መከላከያ ወይም መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ከወሰደች ወይም • ከወለደች ስድስት ወር ያልሞላት እና ሙሉ-በሙሉ ጡት የምታጠባ ከሆነ ነው። <p>በእንደዚህ ሁኔታ የእርግዝና መከላከያ መርፌውን ዘግይተው ከወሰዱ በኋላ ለመጀመሪያዎቹ 7 ቀናት መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ መውሰድ ይኖርባቸዋል።</p> ➢ ተጠቃሚዎች ከአራት ሳምንት በላይ ዘግይታ ከመጣችና ይህንን መስፈርት ካላሟላች አለማርገዟን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል።
<p>መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ስለመጠቀም</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ሴቷ ዘንግታ ወይም በሌላ ምክንያት መርፌውን ሳትወስድ ብትቀር ሌላ መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ መጠቀም ያስፈልጋታል። ➢ መጠባበቂያ የእርግዝና ዘዴዎች የምንላቸው ከሩካቤ መታቀብ፣ የወንድ ወይም የሴት ኮንዶም መጠቀም፣ ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያዎችን መጠቀም፣ የወንዱን ዘር ፍሬ የሚገድሉ ቅባቶች መጠቀም እና የወንዱን የዘር ፍሬ ወደ ውጭ የማፍሰስ ዘዴ ናቸው። የወንዱን ዘር ፍሬ የሚገድሉ ቅባቶች እና የወንዱን የዘር ፍሬ ወደ ውጭ ማፍሰስ ዝቅተኛ የእርግዝና መከላከል ውጤት ሲኖራቸው፤ ኮንዶም መጠቀም እና ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያዎችን መጠቀም ደግሞ የተሻለ አስተማማኝ የእርግዝና መከላከል ብቃት አላቸው።

ምዕራፍ 6

በክንድ ቆዳ ስር የሚቀበር የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ትረስት ኢምፕላንት II

I. ትረስት ኢምፕላንት II ምንድን ነው?

ትረስት በክንድ ቆዳ ስር የሚቀበር ባለነጠላ አካላዊ ቅመም የእርግዝና መከላከያ ሲሆን፤ የተሰራውም በተፈጥሮ በሴቶች አካል ውስጥ የሚመረተውን ፕሮጀስትሮን ሆርሞን (አካላዊ ቅመም) ከሚመስል ፕሮጀስቲን የተባለ በሳይንሳዊ መንገድ የተፈበረከ ንጥረነገር ነው።

ትረስት የክብሪት እንጨት የሚያክል መጠን ያለው ሲሆን፤ በላይኛው የሴት ግራ ክንድ ቆዳ ስር ከተቀበረበት ጊዜ ጀምሮ ለ4 አመታት ቀስ በቀስ ወደ ሴቷ አካል ፕሮጀስቲንን በማሰራጨት እርግዝና እንዳይከሰት ይከላከላል።

እያንዳንዱ ትረስት ኢምፕላንት II ሁለት የክብሪት እንጨት መጠን ያላቸው እያንዳንዳቸው ባለ 75ሚ.ግ ሌቮኖርጀስትሪል የያዙ ከሲላስቲክ በተሰራ ፕላስቲክ የተሸፈኑ የእርግዝና መከላከያዎችን ይዟል። በተጨማሪም ትረስት ኢምፕላንትን በቆዳ ስር ለመቅበር የሚረዳ ለአንድ ጊዜ አገልግሎት ብቻ የሚጠቅም ትሮካር/ማስገቢያ ይዟል።

ትረስት በሴቷ ክንድ ቆዳ ስር የሚቀበረው እና አገልግሎቱ ሲያበቃ ወይም በሴቷ ፍላጎት መሠረት የሚወጣው በሰለጠነ የጤና ባለሙያ ብቻ ነው።



ምስል 6.1 ትረስት ኢምፕላንት II - በክንድ ቆዳ ስር የሚቀበር የእርግዝና መከላከያ

II. እርግዝናን የሚከላከለው እንዴት ነው?

- የሴቷ እንቁላል ከእንቁልጢ ተኮርታ (በሰላ) እንዳትወጣ በማድረግ (ውጻትን በመከላከል)፤
- የማህፀን በር ፈሳሽን በማወፈር የወንድ የዘር ፍሬ ወደ ማህፀን እንዳያልፍ በማገድ፤
- ያኮረተችዋን እንቁላል የጉዞ እንቅስቃሴ በማዘግየት እርግዝና እንዳይፈጠር ይከላከላል።

III. እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

ትረስት ኢምፕላንት II በሚጠቀሙ ሴቶች ላይ እርግዝና የመከሰት እድሉ 1% ነው። በአንድ አመት ውስጥ ትረስትን ከሚጠቀሙ 10,000 ሴቶች መካከል እርግዝና ሊከሰት የሚችለው በ5ቱ ሴቶች ላይ ብቻ ነው። ትረስት እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ እንደ ተጠቃሚዎቹ የአጠቃቀም ሁኔታ አይወሰንም ምክንያቱም አንድ ጊዜ በሴቷ ከንድ ቆዳ ስር በትክክል ከተቀበረ በኋላ ተጠቃሚዋ ሴት አስተማማኝነቱን ጠብቆ ለማቆየት ምንም ማድረግ አይጠበቅባትም። ትረስት ውጤታማ የማይሆነው በከንድ ቆዳ ስር በሚቀበርበት ወቅት ያልታወቀ እርግዝና ከነበረ ወይም በትክክል ካልተቀመጠ ነው። ስለሆነም አገልግሎቱ መሰጠት ያለበት እርግዝና አለመኖሩ ተረጋግጦ እና በሰለጠነ የጤና ባለሙያ ብቻ ነው። ትረስትን ስትጠቀም የነበረች ሴት ለማርገዝ ብትፈልግ መከላከያውን ከክንጂ ውስጥ በማስወጣት ያለምንም መዘግየት ማርገዝ ትችላለች።

ትረስት ኢምፕላንት II ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ ከማንኛውም ተላላፊ የአባላዘር በሽታዎች አይከላከልም።

IV. የጎንዮሽ ችግሮች

- የወር አበባ ሙብዛት እና ከሶስት ወር በኋላ በጣም መቀነስ ወይም መቆም
- የራስ ምታት
- ድብርት
- የሆድ ቁርጠት
- ብጉር (ሊባባስ ወይም ሊቫቫል ይችላል)
- ከብደት መቀነስ ወይም መጨመር
- የጡት መደደር
- የማህፀን በር ቁስለት
- የእንቁልጢ እጢ
- የሽንት ትቦ አካባቢ ቁስለት
- የጀርባ ህመም ወይም አጠቃላይ የህመም ስሜት

- የስሜት መለዋወጥ
- ማቅለሽለሽ
- የህመም ስሜት ያለው የወር አበባ
- በሴቷ ክንድ ላይ ትረስት በተቀበረበት አካባቢ የሚሰማ የህመም ስሜት

ትረስት ከመሰጠቱ በፊት ስለሚፈጠረው የወር አበባ መዘባት እና ሌሎች የጎንዮሽ ችግሮች በቂ የሆነ ምክር ለሴቷ መሰጠት አለበት። ይህ ሴቷ ትረስትን በቀጣይነት መጠቀሟን እንድትቀጥል ይረዳል።

V. ትረስት ኢምፕላንት ላይ የሚያስገኛቸው የጤና ጥቅሞች

ትረስት እርግዝናን ከመከላከል በተጨማሪ የሚከተሉትን የጤና ችግሮች ለመከላከል ይረዳል፡-

- የማህጸን አካባቢ ቁስለትን በተጨማሪም
- ደም ማነሰን ሊከላከል ይችላል።

አንዳንድ ሴቶች ለምን ትረስት ኢምፕላንት ላይ ይመርጣሉ?

- እርግዝናን በጣም በአስተማማኝ ሁኔታ መከላከል
- አንድ ጊዜ በክንድ ቆዳ ስር ከተቀበረ በኋላ እስከሚወጣበት ጊዜ ድረስ ሌላ ተጨማሪ ወጪ የሌለው መሆኑ
- አንድ ጊዜ በክንድ ቆዳ ስር ከተቀበረ በኋላ ተጠቃሚዋ ሴት ማከናወን የሚጠበቅባት ምንም ሌላ ተጨማሪ ስራ አለመኖሩ
- በግብረ ስጋ ግንኙነት መሐል አለማስተጓሉ
- ለረጅም ጊዜ እርግዝናን መከላከል
- ማንኛውም ተያያዥ የጎንዮሽ ችግሮች ልክ ትረስት ከሴቷ ክንድ ውስጥ እንደወጣ ወዲያው የሚያቋርጥ መሆኑ

VI. ትረስት ኢምፕላንት ላይ ሊያስከትላቸው የሚችሉ የጤና ችግሮች

የመከሰት እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም ትረስት የተቀበረበት የሴቷ ክንድ ቆዳ አካባቢ የሚፈጠር ቁስለት/ኢንፌክሽን። ይህ በአብዛኛው የሚከሰተው ትረስት ተገቢው ንፅህና ባልተጠበቀበት ሁኔታ በሴቷ ክንድ ቆዳ ስር ከተቀበረ ነው።

የመከሰት እድሉ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም አገልግሎቱን ሲጨርስ ወይም ሴቷ ለማርገዝ ስትፈልግ ወይም በሌላ ምክንያት ማቋረጥ ሲፈለግ ከሴቷ ክንድ ውስጥ በቀላሉ አለመውጣት።

VII. ስለ ትረስት ኢምፕላንት II ማወቅና መገንዘብ ያለብን ትረስት፡

- ከተቀበረበት ቦታ ከወጣ ወደ ሴቷ ሰውነት የሚለቀቀው ሆርሞን መሰራጨት ስለሚያቆም ወዲያውኑ እርግዝና የመከላከል ስራውን ያቆማል።
- የወር አበባ መቅረት ሊያስከትል ቢችልም እንኳ ከዚህ ጋር የተያያዘ የጤና ችግር አያስከትልም። ይህም በእርግዝና ወቅት ከሚከሰተው የወር አበባ መቆም ጋር ተመሳሳይነት ያለው ዓይነት እንጂ ደም በሴቷ ሰውነት ውስጥ እንዲከማች አያደርግም።
- ሴቶች መካን እንዲሆኑ አያደርግም
- ከተቀበረበት ቦታ ተንቀሳቅሶ ወደ ሴቷ ሌላ የሰውነት ክፍል አይዘዋወርም
- ከመቀበሩ አስቀድሞ በተከሰተ እርግዝና ላይ የሚያስከትለው ምንም ዓይነት ውጤት/ጉዳት የለም
- ከማህጸን ውጪ የሚከሰት እርግዝናን ይከላከላል።

VIII. ትረስት ኢምፕላንት II ን መጠቀም የሚችሉት የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

በአጠቃላይ ሁሉም ሴቶች ትረስትን ምቹ እና አስተማማኝ በሆነ መልኩ መጠቀም ይችላሉ። ትረስትን መጠቀም የሚችሉ ሴቶች፡-

- ❖ ልጅ ያላቸው ወይም የሌላቸው
- ❖ ያገቡ ወይም ያላገቡ
- ❖ አፍላ ወጣቶች እና ከ40 አመት በላይ የሆናቸው ሴቶችን ጨምሮ በማንኛውም የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶች
- ❖ በማንኛውም የዕድሜ ክልል ያሉ ሲጋራ የሚያጨሱ ሴቶች
- ❖ ፅንሰ ያቋረጠች ወይም ያስወረዳት ሴት
- ❖ የደም ማነስ ያለባቸው ወይም በፊት የነበረባቸው ሴቶች
- ❖ ጡት የሚያጠቡ እናቶች (ልጅ ከወለዱ ከስድስተኛው ሳምንት ጀምሮ)
- ❖ የፀረ -ኤች አይ ቪ መድሀኒት ቢወስዱም ባይወስዱም የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሴቶች ኮንፊደንስን መጠቀም ይችላሉ።

ትረስት ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ላለባቸው ሴቶች

የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለ ወይም የፀረ ኤች.አይ.ቪ መድሀኒት እየወሰዱ ያሉ ሴቶች ትረስትን ያለምንም ችግር መጠቀም ይችላሉ። እነዚህ ሴቶች ከትረስት ጋር በጥምረት ኮንዶም እንዲጠቀሙ ማበረታታት ያስፈልጋል። ኮንዶም በትክክል እና በዘላቂነት ከተጠቀሙ ከአባላዘር በሽታዎች ይከላከላል።

XI. ትረስት ኢምፕላንት II ን መጠቀም የማይችሉ የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

- ❖ ጡት የሚያጠቡና ከወለዱ ከ6 ሳምንት በታች የሆኑ ሴቶች
- ❖ በእግር እና በሳንባ አካባቢ ባሉ የደም ስሮች ደም መርጋት ካለ
- ❖ መንስኤው ያልታወቀ የማህፀን መድማት ካለ
- ❖ ባለፈው 5 አመት ጊዜ ውስጥ የተከሰተ የጡት ካንሰር ህመም ካለ
- ❖ የተባባሰ የጉበት በሽታ፣ቁስለት ወይም እብጠት ካለ
- ❖ ለሚጥል በሽታ መድሀኒት በመውሰድ ላይ ለሚገኙ እና ሪፋምፕሲን የተባለ የቲቢ መድሀኒት ለሚወስዱ ሴቶች ትረስት አይሰጥም። እነዚህ መድሀኒቶች የትረስትን እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነት ስለሚቀንሱ አብረው መወሰድ ካለባቸው መጠባበቂያ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ መጠቀም ያስፈልጋል።

ምዕራፍ : 7

በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ሎንግአክት እና ዩ-ኬር

በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ መጠኑ ትንሽ የሆነ፤ ተጣጣፊ እና ከፕላስቲክ የተሰራ ሲሆን፤ በውስጡ የፕሮጀስቲን አካላዊ ቅመም መሰል ንጥረነገር እንዲይዝ ተደርጎ ወይም በላዩ ላይ ከክር የቀጠነ የመዳብ ጥምዝ እንዲኖረው ተደርጎ የሚዘጋጅ የእርግዝና መከላከያ ነው። ይህ ዓይነቱ የእርግዝና መከላከያ በሴቷ ማህፀን ውስጥ በመቀመጥ ለረዥም ዓመታት እርግዝና እንዳይከሰት ይከላከላል።

በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ በሴቷ ማህፀን ውስጥ መቀመጥም ሆነ መውጣት ያለበት በቂ ስልጠና በወሰደ እና ልምድ ባለው የጤና ባለሙያ ብቻ ነው።

ዲ.ኬ.ቲ ኢትዮጵያ ሁለት ዓይነት በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያዎችን ያቀርባል። እነዚህም በላያቸው ላይ ከክር የቀጠነ የመዳብ ጥምዝ እንዲኖራቸው ተደርገው የተዘጋጁት ሎንግአክት (ኮፐር-ቲ 380ኤ) እና ዩ-ኬር (ኮፐር 375) ናቸው።

I. ሎንግአክት (ኮፐር-ቲ 380ኤ) እና ዩ-ኬር (ኮፐር 375) ምንድን ናቸው?

ሎንግአክት (ኮፐር-ቲ 380ኤ) እና ዩ-ኬር (ኮፐር 375) በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ ትንሽ፤ ተጣጣፊ እና ቀጭን የመዳብ ጥቅል በላያቸው ከያዙ ፕላስቲክ የተሰሩ ናቸው። ሎንግአክት የእንግሊዝኛ ፊደል ቲ (T)ን የሚመስል ቅርፅ ያለው ሲሆን፤ ዩ-ኬር ደግሞ የአናቱ ቅርጽ የእንግሊዝኛ ፊደል ዩ (U)ን ይመስላል። በታችኛው ጫፋቸው ላይ የሚገኝ ባለቀለም ተንጠልጣይ ክር መሰል ጭራ ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬር በማህፀን ውስጥ ከተቀመጠ በኋላ በታውን ሳይለቅ በተገቢው ሁኔታ መቀመጡን ለመፈተሽና ለማረጋገጥ ይጠቅማል።

ሎንግአክት እስከ 12 ዓመታት እርግዝናን የሚከላከል ሲሆን ዩ-ኬር ደግሞ እስከ 5 ዓመታት እርግዝናን ይከላከላል።

ሎንግአክት እና ዩ-ኬርን ለረጅም ጊዜ እርግዝና መከላከያነት ከሚሰጡት አገልግሎት በተጨማሪ እንደ ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ ዘዴም መጠቀም ይቻላል።



ምስል 7.1 ሎንግአክት (ኮፐር-ቲ 380ኤ) በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ



ምስል 7.2 ዩ-ኬር (ኮፐር 375) በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ

II. እርግዝናን የሚከላከለው እንዴት ነው?

- በማህፀን ውስጥ የእንግዳ አካል አፀግብሮት በመፍጠር የማህፀን አካባቢና ዙሪያው ላኮረተች እንቁላልም ሆነ ለወንዱ የዘር ፍሬ ህልውና ምቹ እንዲይሆን በማድረግ፤
- የወንዱ የዘር ፍሬ እና የሴቷ እንቁላል ከመገናኘታቸው በፊት ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ በማድረግ፤
- ያኮረተችዋን እንቁላል እና የወንዱን የዘር ፍሬ የጉዞ እንቅስቃሴ በመግታት እንዳይገናኙ በማገድ እርግዝና እንዳፈጠር ይከላከላል።

III. እርግዝናን የመከላከል አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ በዓለም ላይ ካሉ ዘመናዊ የእርግዝና መከላከያዎች ውስጥ እጅግ በጣም አስተማማኝ ውጤት ያለው እና ተመራጭ ዘዴ ነው። በማህፀን የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ ከሚጠቀሙ 100 ሴቶች መካከል በመጀመሪያው ዓመት እርግዝና ሊከሰት የሚችለው በ 0.7ቱ ላይ ብቻ ነው። በተጠቃሚዎች ዘንድ መከላከያውን በዘለቄታ የመጠቀም አዝማሚያም በጣም ከፍተኛ ነው። በብዙ ታዳጊ ሀገሮች መከላከያውን መጠቀም ከጀመሩ አንድ ዓመት በሞላቸው ሴቶች ላይ በተደረጉ ጥናቶች እንደታየው በአማካይ ከ70-90% የሚሆኑ ሴቶች መከላከያውን ከማህፀናቸው ሳያስወጡ መጠቀም እንደቀጠሉ ለማወቅ ተችሏል።

IV. የጎንዮሽ ችግሮች

- በወር አበባ ላይ የሚከሰቱ ለውጦች ለምሳሌ:- የወር አበባ መዛባት በተለይ በመጀመሪያዎቹ 3 እስከ 6 ወራት በወር አበባ ጊዜ ብዙ ደም መፍሰስ እና ወር አበባ የሚፈሰባቸው ቀናት መርዘም በወር ውስጥ በማንኛውም ቀን የሚከሰት የደም መፍሰስ በወር አበባ ጊዜ ሊሰማ የሚችል የሆድ ቁርጠት እና የህመም ስሜት መባባስ
- በማህፀን ውስጥ የተቀመጠ የእርግዝና መከላከያ እያለ ላረገዘች ሴት ውርጃ የመከሰት ዕድሉ 55% አካባቢ ነው።

ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬር በማህፀን ውስጥ ከመቀመጡ በፊት ስለሚፈጠረው የወር አበባ መዛባት እና ሌሎች የጎንዮሽ ጉዳዮች በቂ የሆነ ምክር ለሴቷ መሰጠት አለበት። ይህ ሴቷ በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያውን በቀጣይነት መጠቀሟን እንድትቀጥል ይረዳል።

V. ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬር የሚያስገኛቸው ጤና ነክ ጥቅሞች

- ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬር እርግዝናን ከመከላከል በተጨማሪ የሚከተሉትን የጤና ችግሮች ለመከላከል ይረዳል:-
- የማህፀን ግድግዳ ካንሰር እና
 - የማህፀን በር ካንሰር

አንዳንድ ሴቶች ለምን ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬርን ይመርጣሉ?

- እርግዝናን በጣም በአስተማማኝ ሁኔታ መከላከሉ
- አንድ ጊዜ በማህፀን ውስጥ ከተቀመጠ በኋላ እስከሚወጣበት ጊዜ ድረስ ሌላ ተጨማሪ ወጪ የሌለው መሆኑ

- አንድ ጊዜ በማህፀን ውስጥ ከተቀመጠ በኋላ ተጠቃሚዎ ሴት ማከናወን የሚጠበቅባት ምንም ሌላ ተጨማሪ ስራ አለመኖሩ
- ለረጅም ጊዜ እርግዝናን መከላከል
- ማንኛውም ተያያዥ የጎንጦሽ ችግሮች ልክ ሎንግኦት ወይም ዩ-ኬር ከሴቷ ማህፀን ውስጥ እንደወጣ ወዲያው የሚያቋርጥ መሆኑ
- በማህፀን ውስጥ ልክ እንደተቀመጠ እርግዝናን የመከላከል ውጤቱ ወዲያውኑ የሚጀምር መሆኑ

VI. ሎንግኦት ወይም ዩ-ኬር ሊያስከትለው የሚችል የጤና ችግር

የመከሰት እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም

ሴቷ በደሟ ውስጥ ከዝቅተኛ የመዳብ ክምችት ጋር የተያያዘ የደም ማነስ ካለ እና በማህፀን ውስጥ የሚቀመጠው የእርግዝና መከላከያ በወር አበባ ወቅት ብዙ የደም መፍሰስ ከፈጠረ የደም ማነሱ ሊባባስ ይችላል።

ሎንግኦት ወይም ዩ-ኬር በሚገባበት ወቅት ሴቷ እንደ ባምቡሌ ወይም ጨብጥ የአባላዘር በሽታ ካለባት የማህፀን አካባቢ ቁስለት ሊፈጠር ይችላል።

የመከሰት እድላቸው እጅግ በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም

የማህፀን ግድግዳ መሸንቆር እና

ከማህፀን ውጪ የሚፈጠር እርግዝና ሊከሰት ይችላል።

VII. ስለ ሎንግኦት ወይም ዩ-ኬር ማወቅ እና መገንዘብ የሚገባን

ሎንግኦት ወይም ዩ-ኬር፡

- ከማህፀን ውስጥ ከወጣ በኋላ ሴቷ ብታረግዝ ውርጃ የመከሰት እድልን አይጨምርም
- ሴቶች መካን እንዲሆኑ አያደርግም
- የወሊድ ችግር አይፈጥርም
- ለካንሰር በሽታ አያጋልጥም
- ከማህፀን ውጪ ተንቀሳቅሶ ወደ ሴቷ ሌላ የሰውነት ክፍል አይዘዋወርም
- በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት የህመም ስሜት አይፈጥርም
- በማህፀን ውስጥ እያለ ሴቷ ብታረግዝ በፅንሱ ላይ የሚፈጠር የጤና ችግር ወይም በእርግዝና ወቅት የሚፈጠር የማህፀን አካባቢ ቁስለት የመከሰት ዕድላቸውን አይጨምርም።

VIII. ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬር መጠቀም የማይችሉ ሴቶች የትኞቹ ናቸው?

በአጠቃላይ ሁሉም ሴቶች ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬርን ምቹ እና አስተማማኝ በሆነ መልኩ መጠቀም ይችላሉ። ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬርን መጠቀም የማይችሉ ሴቶች፡-

- ያረዘዘች ወይም እንዳረዘዘች የምትጠረጠር ሴት
- መንስኤው ያልታወቀ የደም መፍሰስ ካለ
- ባለፈው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሴቷ ለአባላዘር በሽታ ተጋልጣ ከነበረ
- ሴቷ ከማህፀን ውጪ የሚፈጠር እርግዝና አጋጥሟት የሚያውቅ ከነበረ ወይም ከማህፀን ውጪ ሊፈጠር ለሚችል እርግዝና ተጋላጭ ከሆነች
- በተፈጥሮ ወይም በሌላ ምክንያት የማህፀን ቅርጽና አቀማመጥ ላይ ችግር ካለ
- የማህፀን ቁስለት ካለ
- ሴቷ የኮፐር ንጥረነገር አለርጂ ካለባት

XI. ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬርን መጠቀም የሚቻለው መቼ ነው?

ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬርን መጠቀም የሚቻለው ሴቷ እርጉዝ እንዳልሆነች በምርመራ ከተረጋገጠ ብቻ ነው። ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬርን በማህፀን ውስጥ ለማስቀመጥ ተመራጭ የሆነው ጊዜ ሴቷ የወር አበባ ላይ እያለች ነው። ይህም በአንድ በኩል ሴቷ እርጉዝ እንዳልሆነች አስተማማኝ ማረጋገጫ ይሆናል፤ በሌላ በኩል ደግሞ በወር አበባ ወቅት የማህፀን በር የመለጠጥ ባህሪ ስላለው ሎንግአክትን ወይም ዩ-ኬርን በቀላሉ በተለጠጠው የማህፀን በር በመግፋት ወደውስጥ ማስቀመጥ ያስችላል። ሎንግአክት ወይም ዩ-ኬርን በማህፀን ውስጥ ለማስቀመጥ ሌሎቹ አማራጮች ደግሞ ሴቷ ጥንቃቄ የጎደለው የግብረሰጋ ግንኙነት ባደረገች በ5 ቀናት ጊዜ ውስጥ፤ ሴቷ ወልዳ የአንግዴ ልጁ በወጣ ወይም ሴቷ አስወርዳ ባሉት 15 ደቂቃ ጊዜ ውስጥ ናቸው። በቀዶ ጥገና የተገላገለች ወላድ እናት ከወለደች 12 ሳምንት ወይም ከዚያ በላይ እስኪሆናት ድረስ በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያን መጠቀም አትችልም።

ምዕራፍ 8

በወሊድ ጊዜ የሚከሰት ከፍተኛ የደም መፍሰስ መከላከያ እና ማከሚያ ሚሶ-ፌም (ሚሶፕሮስቶል 200ማይክሮግራም)

I. ሚሶ-ፌም ምንድን ነው?

ሚሶ-ፌም በተፈጥሮ በሠው አካል ውስጥ የሚገኘውን ፕሮስታግላንዲን ከሚመስል ፕሮስታግላንዲን ኢብ የተባለ በሳይንሳዊ መንገድ የተፈበረከ ንጥረነገር የተሰራ እንክብል ሲሆን፤ በማህፀን ላይ ልክ እንደ አካላዊ ቅመሞች (ሆርሞን) ተመሳሳይነት ያለው ውጤትን ያስከትላል።

እያንዳንዱ የሚሶ-ፌም እሽግ ይዘታቸው ሚሶፕሮስቶል 200ማይክሮግራም የሆነ 4 ፍሬ እንክብሎችን ይዟል።

ሚሶ-ፌም በወሊድ ጊዜ ሊከሰት የሚችል እናቶችን ለሞት የሚዳርግ ከፍተኛ የደም መፍሰስን ለመከላከል እና ለማከም ይጠቅማል።



ምስል. 8.1 ሚሶ-ፌም በወሊድ ጊዜ የሚከሰት የደም መፍሰስ መከላከያ እና ማከሚያ እንክብል

II. ሚሶ-ፌም እንዴት ነው የሚሰራው?

- የማህፀን ግድግዳ እንዲከማተር በማድረግ
- የደም መፍሰስን በመቀነስ
- የማህፀን በር እንዲለሰልስና እንዲከፈት በማድረግ
- ማህፀን በውስጡ ምንም ነገር እንዳይኖርና በውስጡ ያለውን ገፍቶ እንዲያወጣ በማድረግ

III. የጎንዮሽ ችግሮች

- የሠውነት መንዘፍዘፍ
- የሠውነት መቀት መጠን መጨመር
- ማቅለሽለሽ
- ማስመለስ
- የራስ ምታት ህመም

እነዚህ የጎንዮሽ ችግሮች በአብዛኛው ያለምንም የህክምና እርዳታ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በራሳቸው ይጠፋሉ። ሚሶ-ፊም በመርፌ ከሚሰጠው ተመሳሳይ ጥቅም ያለው አክሲቶሲን የተባለ መድኃኒት ጋር ሲነፃፀር በሠውነት ውስጥ ገብቶ ስራውን የሚጀምርበት ፍጥነት በመጠኑ ዘግየት ይላል።

IV. ሚሶ-ፊምን መጠቀም የሚቻለው እንዴት ነው?

ሚሶ-ፊም የሚሰጠው ጥቅም	መወሰድ ያለበት መጠን	የሚሶ-ፊም እንክብል መወሰድ ያለበት መንገድ	አወሳሰድ
በወሊድ ጊዜ የሚከሰት ከፍተኛ የደም መፍሰስን ለመከላከል	600 ማይክሮግራም	በአፍ በመዋጥ	በሶስተኛው የምጥ ደረጃ ልክ ህፃኑ እንደተወለደ እና ሌላ ህጻን በማህፀን ውስጥ እንዳልቀረ ሲረጋገጥ ሚሶ-ፊም ለደም መፍሰስ መከላከያነት ይሰጣል። ሁለትና ከዚያ በላይ መንትያ ህፃናት በማህፀን ውስጥ ካሉ ሚሶ-ፊም ከመስጠቱ በፊት ሁሉም ህፃናት መውጣታቸው መረጋገጥ አለበት።
በወሊድ ጊዜ የሚከሰት ከፍተኛ የደም መፍሰስን ለማከም	1000 ማይክሮግራም 800 ማይክሮግራም	በፊንጢጣ በምላስ ስር በማስቀመጥ	እናትየዋ ከፍተኛ የደም መፍሰስ እንዳጋጠማት ከተረጋገጠና የደም መፍሰሱ እየተባባሰ ከሄደ ሚሶ-ፊም ለደም መፍሰስ ማከሚያ መስጠት አለበት። ሚሶ-ፊም ለደም መፍሰስ ማከሚያነት በፊንጢጣ ከመሠጠቱ በፊት ለመከላከያነት በአፍ ከተወሰደበት ጊዜ ቢያንስ የሁለት ሰዓት ልዩነት መጠበቅ ይኖርበታል።

V. የሚሰ-ፌም ጥቅም

ሚሰ-ፌም በወሊድ ጊዜ የሚከሰት የደም መፍሰስን በከፍተኛ ሁኔታ በመከላከል እና በማከሚያ እናቶች ለህልፈት እንዳይዳረጉ ህይወታቸውን ይታደጋል።

ሚሰ-ፌም፡

- ምቹና አስተማማኝ ነው
- አሰጣጡ ቀላልና ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው የጤና ባለሙያዎች እንዲኖሩ አያስገድድም
- ለማስቀመጥ/ለማከማቸት የማቀዝቀዣ ሰንሰለት (ፍሪጅ) አያስፈልገውም
- የተለያዩ የአወሳሰድ መንገድ አማራጮች አሉት (በአፍ፣ በፊንጢጣ፣ በምላስ ስር፣...)

VI. መወሰድ ያለበት ጥንቃቄ

- ሚሰ-ፌም በቀድሞ ለተገለገለች ወይም ከዚህ ቀደም በቀድሞ ተገላግላ ለምታውቅ እናት አይሰጥም
- ሚሰ-ፌም በሚሰጥበት ጊዜ በማህፀን ውስጥ ህፃን አለመኖሩ መረጋገጥ አለበት
- በታዘዘው መጠን ብቻ መወሰድ አለበት ምክንያቱም የጎንዮሽ ችግሮች ከሚወሰደው የእንክብል መጠን ጋር በቀጥታ ተያያዥነት አላቸው
- ሚሰ-ፌም ለተሰራበት ንጥረነገር አለርጂ ላለባት እናት እንክብሉ መሰጠት የለበትም።

ምዕራፍ 9

ደህንነቱ የተጠበቀ የፅንሰ መቋረጥ

የፅንሰ መቋረጥ ማለት እርግዝና እንዳይቀጥል የሚደረግ እርምጃ ሲሆን፤ ይኸውም አንድ እርግዝና የእርግዝናው ጊዜ ሴቷ ለመጨረሻ ጊዜ የወር አበባ ካየችበት ቀን ጀምሮ ከ28 ሳምንት በታች የሆነው ወይም ሴቷ የወር አበባ ለመጨረሻ ጊዜ የመጣበትን ቀን ካላስታወሰች የፅንሰ ክብደት ከ1000ግራም በታች የሆነውን እርግዝና እንዳይቀጥል የሚደረግ የፅንሰ ማቋረጥ እርምጃ ነው። ሁለት ዓይነት ደህንነታቸው የተጠበቀ የፅንሰ መቋረጥ ዘዴዎች ሲኖሩ እንዚህም በመድኃኒት ፅንሰ ማቋረጥ እና መምጠጫ መሣሪያ በመጠቀም ፅንሰ ማቋረጥ ናቸው። ሶስተኛውና ቀድሞ በህክምና አገልግሎት ይዘወተር የነበረው ስለታማ ብረቶችን በመጠቀም ማህፀንን የመጥረግ ፅንሰ ማቋረጥ ዘዴ በአሁኑ ወቅት ተመራጭ ያልሆነ እና ደህንነቱ ለተጠበቀ ፅንሰ ማቋረጫ ዘዴነት የማይመከር ሆኗል።

ሀ. በመድኃኒት ፅንሰ መቋረጥ

በመድኃኒት ፅንሰ መቋረጥ የመድኃኒት እንክብል ለሴቷ በመስጠት እርግዝና እንዳይቀጥል የሚደረግ እርምጃ ነው። ይህ ዘዴ በሴቷ ፈቃድና ምርጫ ምንም ዓይነት የቀዶ ህክምና ሳያስፈልግ የሚደረግ የፅንሰ ማቋረጥ ነው። ይህን የፅንሰ ማቋረጥ ዘዴ እስከ 28 ሳምንት በታች ድረስ ላለ እርግዝና መጠቀም ይቻላል።

9.1 ሴፍ-ቲ ኪት

I. ሴፍ-ቲ ኪት ምንድን ነው?

ሴፍ-ቲ ኪት ለፅንሰ ማቋረጥ የሚጠቅም መድኃኒት ነው። እያንዳንዱ የሴፍ-ቲ ኪት እሽግ 1 ፍሬ ሜፊፕሪስቶን 200ሚ.ግ እና 4 ፍሬ ሚሶፕሮስቶል 200ማይክሮግራም ይዟል። ሴፍ-ቲ ኪት መስጠት ያለበት በጤና ተቋም ውስጥ በሰለጠነ የጤና ባለሙያ ብቻ ነው።



ምስል 9.1 ሴፍ-ቲ ኪት የፅንሰ ማቋረጫ እንክብል

II. ሴፍ-ቲ ኪት እንዴት ነው የሚሰራው?

ሜፊፕሪስቶን:

- ፅንሱ ከማህፀን ግድግዳ ላይ እንዲላቀቅ ያደርጋል
- የማህፀን በር እንዲለጠጥ ያደርጋል
- ከሴፍ-ቲ ኪት አሽግ ውስጥ መጀመሪያ የሚወሰድ እንክብል ነው
- እንክብሉ የሚወሰደው በአፍ በመዋጥ ብቻ ነው

ሚሶፕሪስቶል

- የማህፀን ግድግዳ እንዲከማተር እና የማህፀን በር እንዲለጠጥ በማድረግ ማህፀን በውስጡ ያለውን ፅንሰ ገፍቶ እንዲያወጣ ያደርጋል
- የሴፍ-ቲ ኪት የመጀመሪያው እንክብል ሜፊፕሪስቶን ከተወሰደ በኋላ ከ36-48 ሰዓታት ባለው ጊዜ ውስጥ ይወሰዳል
- እንክብሎቹ በተለያዩ የአወሳሰድ መንገድ ሊሰጡ ይችላሉ (በአፍ በመዋጥ፣ በምላስ ስር በማስቀመጥ፣ በፊንጢጣ፣ በብልት፣...)

III. አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

ሴፍ-ቲ ኪት እጅግ አስተማማኝ የፅንሰ መቋረጫ ዘዴ ነው። ለምሳሌ እስከ 9 ሳምንት ዕድሜ ላለው እርግዝና የፅንሰ ማቋረጥ አስተማማኝነቱ ከ92-98% ነው።

IV. የሴፍ-ቲ ኪት የአወሳሰድ መመሪያ

- እስከ 7 ሳምንት ዕድሜ ላለው እርግዝና፡ ሜፊፕሪስቶን 200ሚግ በአፍ በሚዋጥ መልኩ፤ ከዚያም ሚሶፕሪስቶል 400ሚግ ክሮግራም በአፍ የሚዋጥ
- እስከ 9 ሳምንት ዕድሜ ላለው እርግዝና፡ ሜፊፕሪስቶን 200ሚግ በአፍ በሚዋጥ መልኩ፤ ከዚያም ከ36-48 ሰዓታት በኋላ ሚሶፕሪስቶል 800ሚግ ክሮግራም በብልት የሚሰጥ
- ከ 12-24 ሳምንታት ዕድሜ ላለው እርግዝና፡ ሜፊፕሪስቶን 200ሚግ በአፍ በሚዋጥ መልኩ፤ ከዚያም ከ48 ሰዓታት በኋላ ሚሶፕሪስቶል 400ሚግ ክሮግራም በአፍ የሚዋጥ፤ ፅንሱ ካልተቋረጠ በየ3 ሰዓቱ ሚሶፕሪስቶሉን እስከ 5 ጊዜ ድረስ በተመሳሳይ መጠን ደግሞ መስጠት
- ከ 24-28 ሳምንታት ዕድሜ ላለው እርግዝና፡ ሜፊፕሪስቶን 200ሚግ በአፍ በሚዋጥ መልኩ፤ ከዚያም ከ48 ሰዓታት በኋላ ሚሶፕሪስቶል 100ሚግ ክሮግራም በአፍ የሚዋጥ፤ ፅንሱ ካልተቋረጠ በየ3 ሰዓቱ ሚሶፕሪስቶሉን እስከ 5 ጊዜ

ድረስ በተመሳሳይ መጠን ደግሞ መስጠት

ማሳሰቢያ: ሴቷ ከሁለት ሳምንት በኋላ ለህክምና ክትትል ወደ ጤና ተቋሙ በመመለስ ፅንሱ ሙሉ-በሙሉ መቋረጡን ማረጋገጥ ይገባል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ፅንሱ መቋረጡ ካልተጠናቀቀ የቀዶ ህክምና (መምጠጫ መሣሪያ) ተጠቅሞ ማጠናቀቅ ያስፈልጋል።

በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር “ደህንነቱን የጠበቀ የፅንሰ ማቋረጥ አገልግሎትን ለመስጠት የተዘጋጀ የአፈፃፀም መመሪያ” ሁለተኛ ዕትም መሠረት በመድኃኒት ፅንሰ ማቋረጥን ደህንነቱን አስተማማኝነቱን በጠበቀ ሁኔታ በሁለተኛው ሶስት ወር (Second Trimester) ለሚገኝ እርግዝና መጠቀም እንደሚቻል አስቀምጧል። በተጨማሪም የመጀመሪያ ደረጃ ክሊኒኮች (Primary Clinics) እስከ 9 ሳምንት እድሜ ላላቸው እርግዝናዎች በመድኃኒት ፅንሰ ማቋረጥ አገልግሎትን መስጠት እንደሚችሉ ተቀምጧል።

ማስጠንቀቂያ: በሁለተኛ ሶስት ወር (Second Trimester) የሚደረግ የፅንሰ ማቋረጥ ሴቷን ለከፍተኛ ደም መፍሰስ እና የከፋ የጤና ችግር ሊዳርግ የሚችል በመሆኑ ሁሉም የሁለተኛ ሶስት ወር ፅንሰ ማቋረጥ መከናወን ያለበት በከፍተኛ ደረጃ የጤና ባለሙያዎች ብቻ ሲሆን በተጨማሪም የአጠቃላይ ማደንዘዣ፣ የደም ልገላ እና ድንገተኛ ቀዶ ህክምና አገልግሎቶች ሊሰጡ በሚችሉባቸው ጤና ተቋማት ውስጥ መሆን አለበት።

V. የሴፍ-ቲ ኪት ጥቅም

- በቀዶ ህክምና ፅንሰ ማቋረጥ ለማትችል ሴት ተመራጭ የሆነ ዘዴ (ለምሳሌ: በተፈጥሮ ወይም በሌላ ምክንያት የማህፀኗ ቅርፅ ወይም አቀማመጥ ትክክለኛ ያልሆነ)
- ምቹና አስተማማኝ
- አወሳሰዱ ቀላል
- ተፈጥሮአዊ የሚመስል አሰራር ያለው
- ማደንዘዣ ወይም ቀዶ ህክምና የማያስፈልገው

VI. የሴፍ-ቲ ኪትን መጠቀም የማይችሉ የትኞቹ ሴቶች ናቸው?

- ከማህፀን ውጪ እርግዝና ካለ ወይም እነዳለ ከተጠረጠረ
- በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ ካለ
- ክሮኒክ አድሬናል ፌይለር ካለ
- የደም መፍሰስ ችግር ካለ ወይም የደም ማቅጠኛ መድኃኒት እየወሰደች ከሆነ
- ሴቷ ስቴሮይድ እየተጠቀመች ያለች ከሆነች
- የሜፊፕሪስቶን ወይም የሚሶፕሮስቶል አለርጂ ካለ

VII. የድህረ-ፅንሰ መቋረጥ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች አሰጣጥ

ሚሶፕሮስቶሉ በተሰጠበት ቀን መጀመር የሚችል የእርግዝና መከላከያ:

በአፍ የሚወሰድ የእርግዝና መከላከያ (ቾይስ፣ ስታይል፣ አይፕላን)

በመርፌ የሚሰጥ የእርግዝና መከላከያ (ኮንፊደንስ)

በክንድ ቆዳ ስር የሚቀበር የእርግዝና መከላከያ (ትረስት)

ኮንዶም (ሰንሴሽን፣ ህይወት ትረስት፣ ሜምቦርስ ኦንሊ)

ለከትትል በምትመጣበት ቀን መሰጠት የሚችል የእርግዝና መከላከያ

በማህፀን ውስጥ የሚቀመጥ የእርግዝና መከላከያ (ሎንግአክት፣ ዩ-ኬር)

9.2 ማራ-ሴፍ

ማራ-ሴፍ ለፅንሰ ማቋረጥ የሚጠቅም መድኃኒት ነው። እያንዳንዱ የማራ-ሴፍ እሾግ 1 ፍሬ ሜሬፕሪስቶን 200ሚ.ግ እና 4 ፍሬ ሚሶፕሮስቶል 200ማይክሮግራም ይዟል።

ማራ-ሴፍ ከሴፍ-ቲ ኪት ጋር ፍፁም ተመሳሳይነት አለው።

ማራ-ሴፍ በዲ.ኬ.ቲ ተመዝግቦ ወደ አገር ውስጥ የሚገባ ምርት ሲሆን ሙሉ በሙሉ ለአገልግሎትና ስርጭት የሚበቃው በማሪ ስቶፕስ ኢትዮጵያ ድርጅት ብቻ ነው።

ለ. በመምጠጫ መሣሪያ በመጠቀም ፅንሰ ማቋረጥ

በመምጠጫ መሣሪያ ተጠቅሞ ፅንሰ ማቋረጥ የቀዶ ህክምና ዘዴ ሲሆን በእጅ ወይም በኤሌትሪክ ኃይል የሚሠራ መሣሪያን በመጠቀም በማህፀን በር በኩል ወደ ማህፀን ውስጥ አልፎ በመግባት ፅንሱን የማውጣት ዘዴ ነው።

9.3 በእጅ ኃይል የሚሰራ የመምጠጫ መሣሪያ በመጠቀም ፅንሰ ማቋረጥ (ማኑዋል ቫኪዩም አስፓይሬሽን)

ይህ የፅንሰ ማቋረጥ ዘዴ ከፕላስቲክ የተሰራ መሣሪያን በእጅ ኃይል በመጠቀም በማህፀን ውስጥ የሚገኙትን የፅንሰ ቅሪቶች በርጋታ በመምጠጥ ለማውጣት የሚከናወን ነው። ይህ ዘዴ ቅሪቶቹን በብረት መሳሪያ በመጠቀም ማህፀንን እየፋቁ ከመጥረግ ይልቅ የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ይህን የፅንሰ ማቋረጥ ዘዴ 12 ሳምንትና ከዚያ በታች ድረስ ላለ እርግዝና መጠቀም ይቻላል። በዚህ ዘዴ የፅንሰ መቋረጥን ለመስራት ከ5-15 ደቂቃ ጊዜ ብቻ ይወስዳል።

በእጅ ኃይል የሚሠራ የመምጠጫ መሣሪያን በመጠቀም የሚደረግ የፅንሰ መቋረጥ በጤና ተቋም ውስጥ አገልግሎቱን ለመስጠት የሚያስችል ደረጃ ባለውና በቂ ስልጠና በወሰደ የጤና ባለሙያ ብቻ መከናወን አለበት።



ምስል 9.2 ለፅንሰ ማቋረጥ የሚጠቅም በእጅ የሚሠራ መምጠጫ መሣሪያ

I. የሚሰራው እንዴት ነው?

እርግዝና በተፈጠረ የመጀመሪያዎቹ ሰባት ሳምንታት አንስቶ እስከ 12 ሳምንት ድረስ ላለ እርግዝና በማህፀን ውስጥ የሚገኙትን የፅንሰ ቅሪቶች መጥጦ በማውጣት ያስወግዳል። ጊዜያቸው ከ6 ሳምንት በታች ለሆኑ እርግዝናዎች ፅንሰ ለማቋረጥ ብቸኛው ዘዴ ነው።

II. አስተማማኝነቱ ምን ያህል ነው?

የመምጠጫ ማሳሪያው ሁሉንም በማህፀን ውስጥ የሚገኙ የፅንሰ ቅሪቶች የማውጣት አስተማማኝነቱ 98% ነው። በማህፀን ውስጥ የቀረ የፅንሰ ቅሪት ካለ ለሁለተኛ ጊዜ መምጠጥ ያስፈልጋል።

ምዕራፍ 10

በተቆማጥ በሽታ የሚከሰት የሠውነት ፈሳሽ እጥረት ማከሚያ ለምለም እና ለምለም ፕላስ

10.1 ለምለም

I. ለምለም ምንድን ነው?

ለምለም በተቆማጥ በሽታ ሊከሰት የሚችለውን የሠውነት ፈሳሽ እጥረት የሚተካ ህይወት አድን ንጥረነገር ነው። ለምለም በዋናነት ህፃናት በተቆማጥ በሽታ አማካኝነት ለሚከሰት ከፍተኛ የሠውነት ፈሳሽ እጥረት እንዳይጋለጡና ለህልፈት እንዳይዳረጉ በመከላከልና በማከም ህይወታቸውን ይታደጋል።

እያንዳንዱ የለምለም እሽግ በውስጡ ሶስት ከረጢት ለምለም ህይወት አድን ንጥረነገር (ኢ.አር.ኤስ) ይዟል።



ምስል 10.1 ለምለም ህይወት አድን ንጥረነገር (የሎሚ ጠዓም ያለው)

II. የለምለም አወሳሰድ

- ለምለምን ከውኃ ጋር ከማዋሃድ በፊት እጃችንን እና የምንጠቀማቸውን ዕቃዎች በንፁህ ውሃና ሳሙና በደንብ ማጠብ፤
- አንድ ሊትር ንፁህ የመጠጥ ውሃ በጀግ ውስጥ መሙላት፤
- በአንዱ ከረጢት ውስጥ ያለውን ለምለም ሙሉ-በሙሉ በተዘጋጀው ውሃ ውስጥ ጨምሮ እስኪሟሟ ድረስ በደንብ ማማሰል፤
- በንፁህ መጠጫ እየቀነሱ ትንሽ ትንሽ ቶሎ ቶሎ መስጠት (ለማጠጣት ጡጦ መጠቀም አይመከርም)።
- አንዴ የተዘጋጀውን የለምለም ፈሳሽ ውህድ መጠቀም የሚቻለው ለ24 ሰዓታት ብቻ ነው። የተረፈውን በመድፋት ለቀጣዩ ቀን አዲስ ማዘጋጀት ያስፈልጋል።

- ዕድሜያቸው ከሁለት ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት አንዱን ሊተር በ24 ሰዓት ውስጥ እንዲጨርሱ መስጠት፤ ዕድሜያቸው ከሁለት ዓመት በላይ የሆኑ ህፃናት እንደየዕድሜያቸው አንዱን ሊተር ከ8-24 ሰዓት ባለ ጊዜ ውስጥ እንዲጨርሱ መስጠት፤ አዋቂዎች በ24 ሰዓት ውስጥ እንደአስፈላጊነቱ ከአንድ ሊተር በላይም መጠጣት ይችላሉ።
 - የእናት ጡት ወተት ለህፃኑ አስፈላጊ ስለሆነ የሚያጠቡ እናቶች ሁልጊዜ ማጥባት መቀጠል ይኖርባቸዋል።
 - መመገብ የጀመረ ህፃን ከሆነ በተቅማጥ ጊዜ ተጨማሪ ምግብና ፈሳሽ መስጠት ያስፈልጋል።
- ❖ ተቅማጡ በሶስት ቀን ጊዜ ውስጥ ካልተሻለ ወይም ከተባባሰ ወይም ተቅማጡ ደም የተቀላቀለበት ከሆነ ወይም ከተቅማጡ በተጨማሪ ሌላ የህመም ስሜት ካጋጠመ ህፃኑን ወደጤና ተቋም በመውሰድ ተገቢውን ህክምና እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋል።

10.2 ለምለም ፕላስ

I. ለምለም ፕላስ ምንድን ነው?

ለምለም ፕላስ በተቅማጥ በሽታ ሊከሰት የሚችለውን የሠውነት ፈሳሽ እጥረት የሚተካ ህይወት አድን ንጥረነገር (ኦ.አር.ኤስ) እና ዚንክ እንክብልን የያዘ ማከሚያ እሽግ ነው።

እያንዳንዱ የለምለም ፕላስ እሽግ በውስጡ ሁለት ከረጢት ለምለም ህይወት አድን ንጥረነገር (ኦ.አር.ኤስ) እና 10 ፍሬ በቀላሉ የሚሟሟ ባለ 20ሚ.ግ የዚንክ ንጥረነገር እንክብሎችን ይዟል።

- ለምለም ኦ.አር.ኤስ ህፃናት በተቅማጥ በሽታ አማካኝነት ለሚከሰት ከፍተኛ የሠውነት ፈሳሽ እጥረት እንዳይጋለጡና ለህልፈት እንዳይዳረጉ በመከላከልና በማከም ህይወታቸውን ይታደጋል።
- ዚንክ ንጥረነገር ተቅማጥ እንዲቀንስ፣ ለብዙ ጊዜ እንዳይቆይ እና ህመሙ እንዳይባባስ ይረዳል። በተጨማሪም ዚንክ ንጥረነገር ከ2-3 ወራት ለሚሆን ጊዜ ሌላ ዙር ተቅማጥ ሳይዝ ለመቆየት የሚያስችል በሽታን የመቋቋም አቅም ይሰጣል፤ የህፃናትን የምግብ ፍላጎት ያሻሽላል እንዲሁም በሽታን የመቋቋም አቅማቸውን ያጎለብታል።



ምስል 10.2 ለምለም ፕላስ (በሎሚ እና በብርቱካን ጠዳም የተዘጋጀ)

II. የለምለም ፕላስ አወሳሰድ

ለምለም ኢ.አር.ኤስን ከላይ በተራ ቁጥር 10.1 (II) በተሰጠው መመሪያ መሠረት ይሰጡ። በተጨማሪም ለ10 ተከታታይ ቀናት በቀን አንዴ የዚንክ እንክብልን ከዚህ በታች ባለው መመሪያ መሠረት እንደየዕድሜያቸው ይሰጡ።

ህፃኑ ከ6 ወር በታች ከሆነ፡-

- አንድ የሻይ ማንኪያ ሙሉ የሚሆን የእናት ጡት ወተት ወይም ንፁህ የመጠጥ ውሃ ወይም የለምለም ኢ.አር.ኤስ ውህድ በንፁህ መጠጫ ውስጥ ማዘጋጀት፤
- አንድ ድፍን የዚንክ እንክብል ከማሸጊያው በማውጣት የእንክብሉ መሐል ለመሐል ባለው መስመር ላይ ለሁለት እኩል መክፈል፤ አንዱን ግማሽ በጥንቃቄ ወደማሸጊያው መልሶ ማስቀመጥ ቀሪውን ግማሽ በመጠጫ ውስጥ በተዘጋጀው ፈሳሽ ውስጥ በማማሰል አሟሟምቶ ለህፃኑ ወዲያውኑ በአንዴ መስጠት።

ህፃኑ ከ6 ወር በላይ ከሆነ፡-

- አንድ የሻይ ማንኪያ ሙሉ የሚሆን ንፁህ የመጠጥ ውሃ ወይም የለምለም ኢ.አር.ኤስ ውህድ በንፁህ መጠጫ ውስጥ ማዘጋጀት፤
- አንድ ድፍን የዚንክ እንክብል በመጠጫ ውስጥ በተዘጋጀው ፈሳሽ ላይ ጨምሮ በማማሰል አሟሟምቶ ለህፃኑ ወዲያውኑ በአንዴ መስጠት።

የእናት ጡት ወተት ለህፃኑ አስፈላጊ ስለሆነ የሚያጠቡ እናቶች ሁልጊዜ ማጥባት መቀጠል ይኖርባቸዋል። መመገብ የጀመረ ህፃን ከሆነ በተቅማጥ ጊዜ ተጨማሪ ምግብና ፈሳሽ መስጠት ያስፈልጋል።

ማሳሰቢያ፡ የዚንክ ንጥረነገር እንክብል ህይወት አድን ንጠረነገር (ኢ.አር.ኤስ)ን አይተካም። ዚንክ ተፈላጊውን ውጤት የሚያስገኘው ከኢ.አር.ኤስ በተጨማሪነት ሲሰጥ ብቻ ነው።

- ❖ ተቅማጡ በሶስት ቀን ጊዜ ውስጥ ካልተሻለ ወይም ከተባባሰ ወይም ተቅማጡ ደም የተቀላቀለበት ከሆነ ወይም ከተቅማጡ በተጨማሪ ሌላ የህመም ስሜት ካጋጠመ ህፃኑን ወደጤና ተቋም በመውሰድ ተገቢውን ህክምና እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋል።

ምዕራፍ 11

ንጽህናው የተጠበቀ የማዋለጃ ቁሳቁሶች ጥቅል እልልታ እና እልልታ ጥላስ

I. እልልታ ምንድን ነው?

እልልታ ለጤናማና አስተማማኝ የማዋለጃ አገልግሎት የሚውሉ ንፅህናቸው የተጠበቀ ስድስት መሠረታዊ የማዋለጃ ቁሳቁሶችን የያዘ ጥቅል ነው። እነዚህም ጥላስቲክ አንሶላ፣ ሳሙና፣ የእጅ ጓንት፣ ፋሻ፣ ንፅህናው የተረጋገጠ ስለት እና እትብት ማሰሪያ ናቸው።

II. እልልታ ጥላስ ምንድን ነው?

እልልታ ጥላስ ለጤናማና አስተማማኝ የማዋለጃ አገልግሎት የሚውሉ ንፅህናቸው የተጠበቀ ስድስት መሠረታዊ የማዋለጃ ቁሳቁሶችን ከመያዝ በተጨማሪ በወሊድ ጊዜ የሚከሰት ከፍተኛ የደም መፍሰስ መከላከያና ማከሚያ ሚሶ-ሬም (ሚሶፕሮስቶል 200ማይክሮግራም) እንክብልን የያዘ ጥቅል ነው።

1. Central Statistical Agency Ethiopia. Mini Demographic and health survey, Central Statistical Agency, Addis Ababa (August 2014)
2. National Population Policy of Ethiopia Addis Ababa, Ethiopia, Office of the Prime Minister (April 1993)
3. Health policy of the transitional government of Ethiopia (2002)
4. Planning and Programming Department, Ministry of Health of Ethiopia. Health and health related Indicators. Addis Ababa (November 2007)
5. World Bank Group. A better World for All –Maternal Mortality. Washington DC, 2000.
6. Technical and Procedural Guideline for Safe Abortion Services in Ethiopia, Federal Ministry of Health (June 2014)
7. Contraceptive Technology, 18th revised edition, Hatcher et al.
8. . “Manual and vacuum aspiration for abortion”. A-Z Health Guide from WebMD. October 2006. http://www.webmd.com/hw/womens_conditions/tw1078.asp. Retrieved February 18 2006.
9. “Miscarriage”. EBSCO Publishing Health Library. Brigham and Women’s Hospital. ^ Wu Y and Wu X (1958). “A report of 300 cases using vacuum aspiration for the termination of pregnancy” (in English translation from BMJ) (PDF). Chinese Journal of Obstetrics and Gynaecology: 447–9. <http://www.bmj.com/cgi/data/336/7657/1332-a/DC1/1>.
10. Dalton, VK; Saunders NA, Harris LH, Williams JA, Lebovic DI (June 2006). “Intrauterine adhesions after manual vacuum aspiration for early pregnancy failure”. Fertility and sterility 85 (6): 1823.e1–3. Doi:10.1016/j.fertnstert.2005.11.065. PMID
11. “Implanon label” (PDF). FDA. 2006-07-17. <http://www.fda.gov/cder/foi/label/2006/0215291bl.pdf>. Retrieved 2006-08-23.

12. Trussell, James (2007). “Contraceptive Efficacy”. in Hatcher, Robert A., et al.. Contraceptive Technology (19th rev. ed.). New York: Ardent Media. ISBN 0-9664902-0-7.
13. Glasier, Anna (2006). “Contraception”. in DeGroot, Leslie J.; Jameson, J. Larry (eds.). Endocrinology (5th ed.). Philadelphia: Elsevier Saunders. pp. 3000–1. ISBN 0-7216-0376-.
14. Organon (April 2006). “Implanon SPC (Summary of Product Characteristics)”. <http://emc.medicines.org.uk/emc/assets/c/html/displaydoc.asp?documentid=5382>. Retrieved 2007-04-15.



dkt
ETHIOPIA